

Comunicazione a:

FARMACIE

Influenza A (H1N1): misure di protezione in farmacia

Richiamo la circolare del medico cantonale del 31 luglio 2009, con cui vi è stato comunicato l'adattamento di strategia nella presa a carico dei pazienti con sintomi influenzali.

Con riferimento a quanto indicato a pagina 4, in questo momento della pandemia e fino a nuova comunicazione, **per il personale delle farmacie** si raccomandano le seguenti misure di protezione:

- Identificare eventuali collaboratori a rischio di complicazioni ed evitare i contatti di questi collaboratori con pazienti che presentano sintomi influenzali e pazienti con diagnosi accertata di influenza A H1N1. Proteggere in particolare le donne in gravidanza.
- Evitare nel limite del possibile i colloqui di lunga durata e i contatti fisici intensi (esempio: misurazione della pressione) con questi pazienti; se tali contatti fossero necessari, proteggersi con una mascherina chirurgica¹.
- Dopo aver servito pazienti con sintomi influenzali e pazienti con diagnosi accertata di influenza A H1N1 disinfettare mani e superfici con un disinfettante alcolico.
- Promuovere la vaccinazione contro l'influenza stagionale.

La profilassi pre-esposizione con Tamiflu al momento non è raccomandata.

È probabile che nelle prossime settimane il rischio di contagio per chi lavora in farmacia aumenti notevolmente. A quel punto potrebbe essere necessario proteggersi con una mascherina chirurgica (almeno una ogni 2 ore per persona)². Invitiamo pertanto chi non lo avesse ancora fatto ad allestire già sin d'ora una scorta adeguata di mascherine.

Ricordo che sul sito www.ti.ch/influenza potete trovare diversi documenti importanti per la vostra attività.

Il farmacista cantonale
Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, OMCT, OFCT

¹ Per le mascherine protettive rimando alla circolare del 10 maggio 2007.

² In alternativa possono essere utilizzate le mascherine FFP2, più performanti, da cambiare ogni otto ore.