

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 40 02/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai Medici
autorizzati al libero esercizio nel
Cantone Ticino

Bellinzona

30 novembre 2009



Ns. riferimento
Info-med 08/2009

Vs. riferimento

Influenza A H1N1: Terza fase della campagna di vaccinazione

Gentile collega,
egregio collega

Desidero informarla sugli ultimi sviluppi epidemiologici riguardanti l'influenza A H1N1 e sugli sviluppi delle modalità di vaccinazione.

1. Evoluzione epidemiologica e segnalazione

Nell'ultima settimana sono stati dichiarati in Svizzera tramite il sistema Sentinella 30.1 casi sospetti di influenza su 1000 consultazioni mediche. Questo numero è più che raddoppiato rispetto alla settimana precedente. Siamo alla quarta settimana in cui, per il Ticino, questo valore si situa al di sopra della soglia epidemica.

Per quanto riguarda la presa a carico allego il nuovo algoritmo ed il nuovo formulario per la segnalazione di casi. Sono da segnalare unicamente i ricoveri e questo avviene per il tramite dei medici ospedalieri.

2. Vaccinazioni contro l'influenza A H1N1

I vaccini disponibili

Considerata la rapida estensione dell'epidemia del virus A (H1N1) in Svizzera e quindi la necessità di permettere una protezione rapida ed efficace di tutti coloro che desiderano evitare l'influenza e le sue complicazioni, i dati sui vaccini sono stati riesaminati.

Visto l'insieme di questi nuovi dati e la disponibilità rispettiva dei vaccini Pandemrix[®], Celtura[®] e Focetria[®] in Svizzera, la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno elaborato le seguenti raccomandazioni di vaccinazione, che corrispondono allo stato più attuale delle conoscenze e sono approvate da Swissmedic. Tutti e 3 i vaccini sono sicuri ed efficaci, ma notevoli differenze nella loro composizione (antigeni e adiuvanti) non permettono di considerarli identici.

Uno schema di vaccinazione iniziato in un paziente con un prodotto deve essere terminato con lo stesso; la somministrazione di vaccini diversi in un paziente non è raccomandata.

Attenzione: vi sono differenti indicazioni per i tre vaccini

Età	Pandemrix®	Focetria® *	Celtura®
6 – 35 mesi	1 x 0.25ml	2 x 0.5ml a 3 settimane d'intervallo	Ø
3 – 9 anni	1 x 0.5ml	**1 x 0.5ml	2 x 0.25ml a 3 settimane d'intervallo
10 - 17 anni	1 x 0.5ml	**1 x 0.5ml	1 x 0.25ml
18 – 39 anni	1 x 0.5ml	-	1 x 0.25ml
40 – 59 anni	1 x 0.5ml	-	2 x 0.25ml, con intervallo tra 0 e 3 settimane
≥ 60 anni	1 x 0.5ml	-	2 x 0.25ml a 3 settimane d'intervallo
Gravidanza	Ø	1 x 0.5ml	1 x 0.25ml (registro necessario)
Immunosoppressione	2 x 0.5ml a 3 settimane d'intervallo	**2 x 0.5ml a 3 settimane d'intervallo	Ø

* Focetria® è d'ora in poi riservato a donne incinte, a bambini con meno di 3 anni, come pure agli immunosoppressi di età compresa tra 3 e 17 anni che ne hanno ricevuto la prima dose.

** Bambini non immunosoppressi che hanno già ricevuto una dose di Focetria® non hanno più bisogno di riceverne una seconda dose a 3 settimane d'intervallo.

Pandemrix®

Il vaccino Pandemrix® è raccomandato a partire dai 6 mesi di età, perché permette di ottenere a qualsiasi età una buona protezione con 1 singola iniezione (salvo per i soggetti immunocompromessi).

Viene sempre fornito in due ampolle da ricostituire in 10 dosi (da usare in 24 ore).

Disponibilità: la seconda fornitura è terminata martedì ed è stato consegnato a tutti i medici il quantitativo inizialmente richiesto per i pazienti a rischio. Numerose altre dosi sono a disposizione e da ordinare come finora direttamente al Farmacista cantonale.

Focetria®

I nuovi dati degli studi scientifici dimostrano che non è più necessaria la seconda dose di Focetria® per i bambini sotto i 10 anni. Rimane raccomandata per i bambini tra i 6 mesi e i 3 anni. Fornito ancora in siringhe monodose pronte all'uso.

Disponibilità: ginecologi e pediatri devono ordinare il vaccino direttamente al Farmacista cantonale e lo riceveranno nei giorni successivi.

Celtura®

L'utilizzo del vaccino Celtura® alle persone immunocompromesse non è raccomandato. E' fornito in siringhe monodose pronte all'uso, ma sprovviste di ago, che verrà fornito a parte. Per questo motivo è da preferire per vaccinare la popolazione generale.

Rendiamo attenti che il Celtura®, necessita 2 iniezioni a 3 settimane d'intervallo per i bambini dai 3 ai 9 anni, così come per le persone sopra ai 60 anni. Per gli adulti tra i 40 e i 59 anni, le 2 dosi di Celtura® possono essere somministrate anche durante la stessa seduta (una iniezione in ogni braccio). Nella fascia di età tra 10 e 40 anni, basta una dose.

Disponibilità: attualmente il Cantone ha a disposizione 23 mila dosi di vaccino Celtura®, una parte è attualmente in distribuzione. Ognuna delle 131 farmacie coinvolte nella distribuzione del vaccino riceverà 10 confezioni di Celtura®, contenenti ognuna 10 siringhe.

La farmacia contatta i medici con cui ha lavorato finora (ginecologi e pediatri esclusi) e fornisce il vaccino (più gli aghi) in base a richiesta e disponibilità.

Le priorità

Ringrazio i medici che hanno aderito alla campagna di vaccinazione contro l'influenza A H1N1 e che si sono attenuti agli schemi e alle modalità non sempre semplici da seguire. La lista dei medici partecipanti è stata chiusa e non possono più essere aggiunti ulteriori medici.

Invito ora tutti i colleghi che non avessero concluso, di finalizzare rapidamente la vaccinazione dei gruppi a rischio e delle persone in contatto con esse, in modo da poter iniziare da lunedì 30 novembre con la vaccinazione della popolazione generale.

In accordo con il Consiglio Direttivo dell'OMCT e le Società di specialità di medicina generale, medicina interna e pediatria, anche la terza fase della vaccinazione sarà garantita dai medici che hanno aderito alla campagna, con le modalità adottate fin qui e sopra descritte.

L'UFSP ha realizzato un apposito formulario per la documentazione delle vaccinazioni eseguite negli studi medici. Questo documento, "Formulario personale per la vaccinazione contro l'influenza pandemica (H1N1) 2009" di cui allego una copia, è anche ottenibile sul sito Internet www.ti.ch/influenza selezionando: medici / vaccino / aiuto alla raccolta dati.

L'uso di questo formulario è facoltativo, ma l'UFSP richiede comunque di documentare il numero di lotto del vaccino, il nome del medico e i dati amministrativi del paziente. Una copia deve essere conservata ed una consegnata al paziente.

Considerazioni particolari

Durante la gravidanza la raccomandazione è di utilizzare il vaccino Focetria®. Il vaccino Celtura® può essere utilizzato, ma è legato alla necessità di registrare le donne vaccinate in un registro nazionale in corso di elaborazione (nell'attesa, è richiesto di allestire una lista che permetterà la registrazione retrospettiva); ne consiglio però l'uso nelle pazienti con anafilassi alle proteine delle uova. Per Pandemrix® il suo utilizzo durante la gravidanza rimane non raccomandato in Svizzera.

Per i pazienti immunosoppressi la raccomandazione di 2 dosi di Pandemrix® o Focetria® a 3 settimane d'intervallo è mantenuta, utilizzando lo stesso vaccino per le due iniezioni.

Per le persone sotto trattamento anticoagulante deve essere utilizzata esclusivamente la via intramuscolare, con compressione al punto d'iniezione. Per i pazienti che presentano severi disturbi della coagulazione, un'iniezione intramuscolare dovrebbe rappresentare una controindicazione alla vaccinazione.

Medici

I pazienti dei medici che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione e i pazienti che non hanno un proprio medico di famiglia, devono essere indirizzati presso uno dei seguenti medici di riferimento:

Regione	Medico	Luogo	Numero telefono
Tre Valli	Dr.ssa C. Goehring	Biasca	091 880 01 41
Bellinzona	Dr. D. Margni	Bellinzona	091 825 80 44
Locarnese	Dr. S. Luban	Locarno	091 751 84 84
Malcantone	Dr. E. Walder	Agno	091 605 14 54
Luganese	Dr. F. Denti	Barbengo	091 995 15 15
Mendrisiotto	Dr. M. Ferrera	Melano	091 649 88 55

Questa lista è anche pubblicata sul sito internet cantonale: www.ti.ch/influenza.

I bambini e i ragazzi tra i 6 mesi ed i 16 anni di età, che non possono vaccinarsi dal proprio pediatra, e le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza o nel post-parto, che non possono essere vaccinate dal proprio ginecologo, possono rivolgersi ai servizi dedicati di pediatria e ginecologia degli ospedali e delle cliniche.

3. Hotline cantonale

Da mercoledì 18 novembre 2009 è stata attivata una Hotline cantonale dedicata all'influenza A H1N1. Telefonando al numero gratuito 0800 144 144 chiunque avesse domande relative alla malattia, alla vaccinazione o ad aspetti organizzativi, può ottenere le informazioni desiderate.

La Hotline è gestita da Ticino Soccorso su indicazioni dell'Ufficio del medico cantonale, pertanto anche i medici possono rivolgersi a questo numero.

4. Segreteria telefonica

Le proiezioni epidemiologiche per il Cantone Ticino prevedono l'arrivo del picco pandemico durante il periodo di Natale. Ricordiamo ai medici con libero esercizio che per garantire ai loro pazienti un'adeguata presa a carico anche durante la loro assenza ed evitare un sovraccarico dei Pronto Soccorsi, deve essere indicato sulla segreteria telefonica il nome del proprio sostituto e il numero della guardia medica (091 800 18 28).

Ringraziandovi della vostra attenzione e sempre gradita collaborazione, colgo l'occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani

Formulario Ospedalizzazione per influenza pandemia (H1N1) 2009 confermata in laboratorio
Formulario personale per la vaccinazione contro l'influenza pandemica (H1N1) 2009
Algoritmo, presa a carico di un caso di influenza