

Prelievo del 20 agosto 2018

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	79.0	19.1	7.9	3.20	1.64
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	78.5	19.0	8.0	3.10	1.51
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	79.0	19.1	8.0	3.10	1.60
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	83.4	20.1	7.5	3.20	1.79
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	80.3	19.4	7.6	3.28	1.86
	Lumino	Ronco	299	71.9	17.5	7.6	3.28	1.48
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	82.5	19.9	7.1	3.30	1.77
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	77.7	18.8	7.9	3.19	1.77
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	79.0	19.1	7.9	3.20	1.70
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	59.8	14.7	15.1	2.81	1.35
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	70.6	17.2	10.0	3.04	1.73
Leventina	Giornico	Lorett	404	70.2	17.1	9.7	3.04	1.48
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorredo	212	78.5	19.0	7.8	3.16	1.40
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248			per		
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	78.1	18.9	8.7	3.16	1.81
	Gordola	Sant'Antonio	271	85.7	20.6	6.9	3.26	1.59
	Lavertezzo	Montedato	310	74.1	18.0	8.0	3.23	1.59
	Minusio	Noledo	368	84.3	20.3	7.8	3.14	1.63
	Tenero-Contra	Moresio	329	77.2	18.7	8.2	3.07	1.60
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	82.5	19.9	6.9	3.24	1.46
	Terre di Pedemonte-Verscio	Calzaniga	249	84.3	20.3	6.8	3.26	1.80

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	60.3	14.8	14.0	2.82	1.38
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	67.2	16.4	11.1	3.02	1.58
	Croglio	Valleggiolo	444	65.4	16.0	12.0	2.99	1.58
	Lamone	Carnago	364	70.6	17.2	7.8	3.19	1.43
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529			np		
	Porza	San Rocco	531	69.8	17.0	9.7	2.98	1.65
	Sessa	Lanera	411	62.8	15.4	12.2	2.96	1.69
	Vezia	Ronco	336	75.0	18.2	8.7	3.17	1.71
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	78.0	18.9	7.8	3.52	1.30
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	73.7	17.9	9.3	3.14	1.82
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	75.0	18.2	9.7	3.16	1.77
	Chiasso-Pedrate	Roncaccio	427	72.4	17.6	9.4	3.10	1.64
	Coldrerio	Campagnola	341	73.7	17.9	8.0	3.20	1.85
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	64.1	15.7	15.3	2.81	1.24
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456			np		
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	73.3	17.8	9.0	3.12	1.83
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	68.9	16.8	8.5	3.21	1.81
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	72.4	17.6	8.4	3.20	2.19
	Mendrisio-Meride	Griago	563			np		
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	62.4	15.3	10.4	3.08	1.52
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	67.2	16.4	11.3	3.07	1.65
	Morbio Inferiore	Paese	355	82.1	19.8	8.2	3.23	1.99
	Novazzano	Brusata	396	68.9	16.8	10.1	3.15	1.50
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	80.8	19.5	7.2	3.24	1.67
Stabio	Monticello	427	71.1	17.3	9.1	3.16	1.54	
Vacallo	Roggiana	327	72.8	17.7	8.6	3.15	1.61	
Riviera	Biasca	Visnone	292	71.5	17.4	8.6	3.10	1.52

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	77.7	18.8	7.6	3.16	1.73
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	77.2	18.7	8.5	3.14	1.75

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora

Risultati medi per distretto

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n=9/9	79.0	7.7
Blenio	n=2/2	65.2	12.6
Leventina	n=1	70.2	9.7
Locarno	n=8/9	80.6	7.6
Lugano	n=7/8	67.3	10.8
Mendrisio	n=16/18	72.3	9.4
Riviera	n=1	71.5	8.6

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino

