

Prelievo del 2 settembre 2019

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	80.8	19.5	8.1	3.24	1.62
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	80.8	19.5	7.8	3.23	1.54
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	80.8	19.5	8.0	3.20	1.65
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	79.0	19.1	7.6	3.28	1.69
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	79.9	19.3	8.2	3.24	1.48
	Lumino	Ronco	299	72.8	17.7	8.9	3.15	1.68
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	88.8	21.3	6.6	3.39	1.72
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	77.2	18.7	7.7	3.24	1.79
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	82.5	19.9	7.3	3.33	1.66
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	62.4	15.3	12.1	2.99	1.90
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	68.0	16.6	11.3	3.10	1.91
Leventina	Giornico	Lorett	404	69.3	16.9	10.7	3.13	1.52
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorredo	212	77.7	18.8	8.3	3.28	1.56
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	83.9	20.2	6.3	3.38	1.74
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	78.1	18.9	8.8	3.21	1.77
	Gordola	Sant'Antonio	271	87.0	20.9	6.5	3.39	1.75
	Lavertezzo	Montedato	310	81.2	19.6	7.3	3.37	1.64
	Minusio	Noledo	368	85.2	20.5	8.1	3.17	1.63
	Tenero-Contra	Moresio	329	83.9	20.2	8.4	3.17	1.77
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	86.1	20.7	7.8	3.27	1.52
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	84.8	20.4	6.9	3.35	1.63

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	76.3	18.5	11.7	3.03	1.65
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	76.3	18.5	9.1	3.17	1.61
	Croglio	Valleggiolo	444	68.9	16.8	10.7	3.13	1.51
	Lamone	Carnago	364	79.9	19.3	7.7	3.23	1.40
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	69.3	16.9	10.5	3.03	1.39
	Porza	San Rocco	531	78.5	19.0	9.6	3.11	1.59
	Sessa	Lanera	411	72.4	17.6	10.5	3.10	1.73
	Vezia	Ronco	336	73.3	17.8	8.9	3.21	1.57
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	91.9	22.0	7.2	3.40	1.50
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	88.8	21.3	8.3	3.21	1.70
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	79.0	19.1	8.0	3.15	1.45
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	86.1	20.7	8.4	3.23	1.54
	Coldrerio	Campagnola	341	79.9	19.3	8.5	3.25	1.80
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	69.3	16.9	10.2	2.95	1.73
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	82.1	19.8	8.3	3.09	1.42
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	79.4	19.2	9.2	3.18	1.90
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	77.7	18.8	8.8	3.22	1.63
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	86.1	20.7	7.6	3.23	1.76
	Mendrisio-Meride	Griago	563	77.2	18.7	9.1	3.18	1.39
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	77.7	18.8	9.3	3.15	1.56
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	79.4	19.2	9.0	3.24	1.88
	Morbio Inferiore	Paese	355	88.8	21.3	8.1	3.27	1.84
	Novazzano	Brusata	396	78.5	19.0	10.1	3.21	1.73
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	86.1	20.7	6.4	3.36	1.53
	Stabio	Monticello	427	76.8	18.6	9.6	3.23	1.56
Vacallo	Ronco	393	83.9	20.2	7.9	3.21	1.60	

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	65.9	16.1	11.0	3.06	1.42
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	75.5	18.3	8.5	3.17	1.52
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			np		

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: varietà Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 9/9	80.3	7.8
Blenio	n= 2/2	65.2	11.7
Leventina	n= 1/1	69.3	10.7
Locarno	n= 9/9	83.1	7.6
Lugano	n= 8/8	74.4	9.8
Mendrisio	n= 18/18	81.6	8.5
Riviera	n= 1/1	65.9	11.0

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale (°Oe): varietà Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale (g/L): varietà Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino (g): varietà Merlot

