

Prelievo del 9 settembre 2019

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	86.1	20.7	7.0	3.28	1.51
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	82.5	19.9	7.0	3.28	1.56
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	83.4	20.1	7.5	3.19	1.68
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	81.6	19.7	6.9	3.30	1.82
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	81.6	19.7	7.5	3.28	1.52
	Lumino	Ronco	299	75.9	18.4	8.0	3.19	1.72
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	88.3	21.2	6.6	3.41	1.73
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	81.6	19.7	7.0	3.28	1.78
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	85.7	20.6	6.7	3.33	1.73
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	68.0	16.6	10.0	3.06	2.06
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	71.5	17.4	10.0	3.14	1.82
Leventina	Giornico	Lorett	404	71.5	17.4	10.5	3.12	1.82
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	80.3	19.4	8.0	3.28	1.66
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	87.4	21.0	6.0	3.40	1.66
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	82.1	19.8	7.8	3.28	1.70
	Gordola	Sant'Antonio	271	89.2	21.4	6.0	3.41	1.72
	Lavertezzo	Montedato	310	85.7	20.6	6.5	3.44	1.74
	Minusio	Noledo	368	89.7	21.5	6.9	3.21	1.72
	Tenero-Contra	Moresio	329	85.2	20.5	8.0	3.16	1.70
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	85.7	20.6	6.8	3.34	1.52
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	85.7	20.6	6.6	3.38	1.73

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	83.4	20.1	10.2	3.12	1.68
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	79.9	19.3	8.3	3.21	1.63
	Croglio	Valleggiolo	444	75.9	18.4	8.9	3.17	1.59
	Lamone	Carnago	364	84.8	20.4	6.7	3.35	1.53
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	71.5	17.4	9.5	3.08	1.61
	Porza	San Rocco	531	83.0	20.0	8.7	3.14	1.63
	Sessa	Lanera	411	75.0	18.2	8.6	3.19	1.80
	Vezia	Ronco	336	80.3	19.4	7.4	3.27	1.63
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	94.2	22.5	6.1	3.59	1.60
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	92.4	22.1	7.4	3.27	1.71
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	83.9	20.2	7.1	3.24	1.65
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	87.9	21.1	7.3	3.29	1.59
	Coldrerio	Campagnola	341	84.3	20.3	7.1	3.32	1.75
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	78.1	18.9	9.1	3.10	1.63
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	88.8	21.3	7.0	3.21	1.65
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	82.1	19.8	8.6	3.20	1.80
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	84.8	20.4	7.4	3.30	1.55
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	89.7	21.5	6.7	3.31	1.97
	Mendrisio-Meride	Griago	563	87.0	20.9	6.7	3.31	1.29
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	79.9	19.3	8.7	3.22	1.64
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	84.3	20.3	8.0	3.23	1.77
	Morbio Inferiore	Paese	355	91.5	21.9	7.0	3.33	1.93
	Novazzano	Brusata	396	85.2	20.5	8.0	3.28	1.70
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	89.2	21.4	5.9	3.40	1.69
	Stabio	Monticello	427	81.2	19.6	8.6	3.25	1.63
	Vacallo	Ronco	393	86.1	20.7	6.7	3.30	1.66

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	75.0	18.2	9.4	3.14	1.52
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	78.1	18.9	7.7	3.23	1.44
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			np		

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: varietà Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 9/9	83.0	7.1
Blenio	n= 2/2	69.8	10.0
Leventina	n= 1/1	71.5	10.5
Locarno	n= 9/9	85.7	7.0
Lugano	n= 8/8	79.2	8.5
Mendrisio	n= 18/18	86.1	7.4
Riviera	n= 1/1	75.0	9.4

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale (°Oe): varietà Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale (g/L): varietà Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino (g): varietà Merlot

