

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	70.20	17.06	8.0	3.21	1.69
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	68.02	16.56	7.9	3.24	1.42
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	71.94	17.49	8.7	3.15	1.28

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 7/8	75.78	8.93
Blenio	n= 0/2	-	-
Leventina	n= 0/1	-	-
Locarno	n= 9/9	76.75	8.98
Lugano	n= 5/8	67.24	10.76
Mendrisio	n= 12/18	71.89	9.14
Riviera	n= /1	70.20	8.00

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

