Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Prelievo del 10 agosto 2026

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	81.19	19.55	7.4	3.318	1.3534
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264	80.75	19.49	7.7	3.263	1.4052
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	86.99	20.87	8.0	3.244	1.6369
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	86.09	20.69	7.4	3.362	1.8216
	Lumino	Ronco	299	82.52	19.91	7.9	3.318	1.5750
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	81.64	19.73	6.7	3.428	1.6152
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	87.44	20.99	7.6	3.328	1.5231
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	86.09	20.69	7.4	3.237	1.5849
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	71.94	17.49	11.5	3.056	1.3767
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	72.38	17.61	10.5	3.211	1.6152
Leventina	Giornico	Lorett	404	81.64	19.73	7.8	3.274	1.3657
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Boscioredo	212	71.07	17.30	7.2	3.371	1.6880
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	82.52	19.85	7.2	3.325	1.6424
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	85.65	20.57	7.3	3.349	1.3575
	Gordola	Sant'Antonio	271	86.54	20.81	6.2	3.381	1.6456
	Lavertezzo	Montedato	276	78.98	19.13	7.6	3.346	1.7906
	Minusio	Noledo	368	88.34	21.17	6.5	3.354	1.5507
	Tenero-Contra	Moresio	329	88.34	21.17	7.1	3.246	1.7946
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	244	78.09	18.89	7.8	3.261	1.6421
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	87.89	21.11	7.3	3.356	1.7804

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Lugano	Val Mara-Rovio	Basso	425	77.21	18.71	8.9	3.189	1.3538
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404			Np		
	Tresa-Croglio	Valleggiolo	444	82.97	20.03	9.1	3.191	1.2243
	Lamone	Carnago	364			Np		
	Monteceneri-Bironico	Costa	539			Np		
	Porza	San Rocco	531	78.98	19.13	10.6	3.017	1.1449
	Tresa-Sessa	Lanera	411	80.30	19.43	8.3	3.242	1.6412
	Vezia	Ronco	336	82.97	20.03	7.5	3.266	1.4522
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306	87.89	21.05	7.0	3.369	1.0373
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	90.58	21.65	7.4	3.262	1.6174
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	82.52	19.85	8.3	3.194	1.3421
	Chiasso-Pedrinate	Roncaccio	427			Np		
	Coldrerio	Campagnola	341	80.30	19.43	7.7	3.215	1.4649
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	80.30	19.37	8.6	3.155	1.4513
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	89.23	21.35	7.1	3.254	1.5408
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380			Np		
	Mendrisio-Ligornetto	Panighella	374	83.86	20.15	7.1	3.301	1.3308
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	82.08	19.79	7.4	3.222	1.5132
	Mendrisio-Meride	Griago	563	66.72	16.26	10.8	3.120	1.4412
	Mendrisio-Rancate	Ronco	398	86.99	20.93	7.6	3.211	1.3232
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	77.21	18.71	8.2	3.196	1.3598
	Morbio Inferiore	Paese	355	86.99	20.87	5.8	3.465	1.6409
	Novazzano	Brusata	396	84.31	20.33	7.8	3.351	1.4271
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	79.86	19.31	6.8	3.330	1.1654
	Stabio	Monticello	427			Np		
	Vacallo	Ronco	393			Np		

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale	pH	Peso medio dell'acino
			(m)	°Oechsle	% Brix	(g/L)		(g)
Riviera	Biasca	Visnone	292	79.42	19.19	6.5	3.346	1.1803
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	82.97	19.97	7.9	3.267	1.3043
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	95.11	22.65	6.8	3.332	1.3732

Legenda
na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/8	84.09	7.51
Blenio	n= 2/2	72.16	10.50
Leventina	n= 1/1	81.64	7.80
Locarno	n= 9/9	83.05	7.13
Lugano	n= 5/8	80.49	8.88
Mendrisio	n= 14/18	82.77	7.69
Riviera	n= 1/1	79.42	6.50

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot



Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot



Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot