

VITICOLTURA: stato attuale della vegetazione e lavori in vigna

Fase fenologica:

Attualmente (11 giugno), si può ancora notare in alcuni vigneti lo **stadio fenologico J** (allegagione). Lo stadio fenologico che si riscontra maggiormente è lo **stadio K** (da grano di pepe a piccolo pisello). La fioritura nelle zone precoci è conclusa con un buon tasso di allegagione contrariamente alle zone in piena fioritura durante il periodo con forti precipitazioni e temperature basse (fine maggio) dove si possono notare ceppi che hanno subito una forte colatura. Rispetto alla scorsa stagione si può ancora annunciare un anticipo della fase fenologica di circa 15 giorni.

Cimatura:

È importante cimare spesso asportando poca foglia piuttosto che cimare di rado asportando molta foglia. Nella pratica della cimatura si devono lasciare germogli lunghi un metro, successivamente si cimera lasciando sempre almeno una foglia nuova.

Sfogliatura:

Una leggera sfogliatura nella zona del grappolo è da prevedere per favorire la penetrazione del prossimo imminente trattamento antibotritico per le varietà bianche ma anche per le varietà rosse. Per le varietà bianche eliminare solamente le foglie che coprono il grappolo e impediscono al prodotto di penetrare. Per le varietà rosse si può asportare anche qualche foglia in più in maniera da abituare gli acini ai raggi solari. Per favorire l'arieggiamento del grappolo eliminare le femminelle vicino ai grappoli.

Lavorazioni del terreno:

Nei nuovi impianti o su viti di 2 anni è ora il momento opportuno per zappettare il sottofila ed eliminare le infestanti dato che il terreno è umido e le stesse vengono estirpate con più facilità.

Situazione peronospora:

Ricordiamo che in Ticino sono attive quattro centraline per il rilevamento delle infezioni della peronospora: Biasca, Cugnasco, Gudo e Mezzana. Sul sito internet: www.agrometeo.ch è possibile venire a conoscenza di importanti informazioni in merito alla peronospora e alla lotta da eseguire.