



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: non in funzione
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 8

Bellinzona: 31 marzo 2003

FRUTTICOLTURA: FRUTTA A GRANELLA

Le precipitazioni previste daranno sicuramente origine al volo delle ascospore e quindi ad una forte pressione della ticchiolatura. Attenzione all'effetto curativo dei prodotti utilizzati. A questo proposito vedere il bollettino fitosanitario n 6.

I trattamenti successivi contro la **ticchiolatura delle mele** combinato con quello contro **l'oidio** verranno applicati tenendo conto della crescita vegetativa, delle condizioni meteorologiche (piogge, umettazione fogliare, temperatura) e del tipo di prodotto utilizzato.

Attualmente si trovano alcuni focolai di **afide verde migrante**. Se non si costata la presenza simultanea dell'**afide galle rosse o di afide verde non migrante** non si effettueranno trattamenti aficidi in quanto, l'afide verde migrante funge da attrattivo e da alimento prezioso per gli ausiliari.

In caso di necessità i prodotti da utilizzare sono gli aficidi specifici, attenzione alle restrizioni per i produttori che praticano la PI:

- *Pirimicarb, Pirimor, Aztec*: si possono utilizzare 1 volta per stagione contro gli afidi della stessa specie.
- *Alanto, Gazelle*: al massimo 2 trattamenti per anno.
- *Confidor WG 70*: 1 trattamento all'anno, al più tardi entro la fine di maggio.
- *NeemAzal*: nessuna efficacia sull'afide verde migrante.

FRUTTA A NOCCILO: INTERVENTI DOPO LA FIORITURA

Albicocco: dopo la caduta dei petali

Vaiolatura, monilia, oidio: Amistar, Colt Elite, Pomstar C, Rondo, Score Top, Veto top.

In caso di forti attacchi dovuti a *monilia*: Carbendazim, Benlate, Enovit (mass. 1 trattamento/anno in quanto tossico per i tiflodromi).

Se il tempo è piovoso ripetere il trattamento postfiore dopo 10-12 giorni.

Pesco: prima della caduta dei calici fiorali.

Oidio, vaiolatura: zolfo bagnabile oppure utilizzare gli stessi prodotti indicati per l'albicocco.

Susino: in caso di fioritura prolungata e di pioggia

Varietà sensibili alla monilia: Amistar, Rovral, Serinal, Switch oppure un ISS (Bayfidan, Nustar, Sporgon) oppure ancora captano + ISS (Baycor C, Colt Elite, Pomstar C, Rondo, Systhane C, Veto Top).

Alla caduta dei petali e solo dopo un approfondito controllo, se necessario, si aggiungerà:

Afidi: Pirimicarb, Pirimor, Croneton.

Oplocampa: Alaxon, Basudin, Diazinon, Pyrinex, Reldan, Quassan, Quassin

Ciliegio: alla caduta dei petali

Vaiolatura: Amistar, Captano (diversi prodotti), Delan, Euparen, Folpet (diversi prodotti) o ISS + Captano.

In caso di ripetute precipitazioni ripetere il trattamento dopo la caduta dei calici fiorali.

Ribadiamo l'invito a proteggere le api e gli altri insetti impollinatori. Non effettuare trattamenti insetticidi, acaricidi e diserbanti durante il periodo della fioritura degli alberi da frutta. Attenzione anche alla presenza di erbe spontanee in fiore.

VIGNETI ABBANDONATI

In questi giorni abbiamo potuto constatare che alcuni vigneti non sono ancora stati potati.

Ribadiamo l'importanza di estirpare i vigneti che non vengono più coltivati in quanto possono diventare focolai di infezione.

Ricordiamo che la Sezione agricoltura può esigere l'estirpazione di vigneti abbandonati.

DIABROTICA VIRGIFERA: DIVIETO DI RISTOPPIO DEL MAIS

Ricordiamo a tutti i coltivatori di mais che nel 2003 è vietato coltivare mais nelle parcelle dove nel 2002 esisteva questa coltura, in tutto il Canton Ticino ad eccezione della Valle Leventina, la Valle di Blenio, la Valle Verzasca, la Valle Maggia, la Valle Onsernone e le Centovalli.

Tale misura, che è la sola veramente efficace per tenere sotto controllo questo temibile fitofago, è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.