



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85  
Fax: 091 / 814 44 64  
Risponditore: 091 / 814 35 62  
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch  
www.ti.ch/agricoltura

**Bollettino fitosanitario n: 16**

**Bellinzona: 24 maggio 2004**

### **VITICOLTURA : PERONOSPORA E OIDIO**

Anche nelle zone viticole più tardive del cantone, il primo trattamento contro la peronospora e l'oidio dovrebbe essere effettuato nel corso di questa settimana.

La centralina Lufft di avvertimento della peronospora di Biasca ha segnalato la possibile infezione primaria della peronospora il 21 di maggio. La fine del periodo di incubazione del fungo è prevista il 29 maggio.

È molto importante l'applicazione di una strategia di lotta che eviti il più possibile l'insorgere di resistenze.

Bagnare accuratamente tutti gli organi della vite rispettando scrupolosamente il dosaggio prescritto sull'imballaggio. Trattare su foglie completamente asciutte e con tempo stabile. Dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per garantire l'efficacia del prodotto.

Ricordiamo che per poter eseguire il trattamento nel migliore dei modi occorre avere l'irroratrice in perfetto stato; è quindi importante un controllo accurato prima di effettuare il trattamento.

Allo scopo di individuare i primi focolai e poter fare un'idea della pressione di questa temibile malattia e poter quindi impostare nel migliore dei modi l'avvertimento durante la stagione, invitiamo i viticoltori a voler segnalare al Servizio fitosanitario (091 814 35 85/86) l'eventuale apparizione della prima macchia sporulante di peronospora.

In alcuni vigneti si riscontrano attacchi dovuti al sigaraio. Non bisogna effettuare dei trattamenti contro questo coleottero fitofago ma è molto importante raccogliere le foglie arrotolate (sigari) sulle viti ed eliminarle.

### **FRUTTICOLTURA : TICCHIOLATURA, AFIDI**

Sulle varietà sensibili si notano i primi attacchi dovuti alla ticchiolatura. Nei frutteti dove si è manifestata la malattia in questione si sospenda l'impiego dei prodotti inibitori della sintesi degli steroli (ISS), delle strobilurine e della dodina per evitare l'insorgere di resistenze o la perdita di efficacia e sostituirli con prodotti quali Delan, captano, folpet che nel contempo prevengono le malattie che si sviluppano durante la conservazione quali il marciume lenticellare e la Gleosporiosi. Controllare le popolazioni degli afidi lanigero e cenerino.

### **CAMPICOLTURA: ATTENZIONE ALLE AGROTIDI**

Si riscontrano i primi danni alle colture di mais dovuti alle larve delle agrotidi.

Questi fitofagi possono attaccare anche altre colture campicole come pure le piante orticole di pieno campo. Invitiamo a voler controllare con regolarità le colture che si trovano ad uno stadio sensibile all'attacco delle agrotidi.

Servizio fitosanitario