



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: 091 / 814 35 62
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 18

Bellinzona: 7 giugno 2004

FRUTTICOLTURA E VIVAISMO: COCCINIGLIA DI SAN JOSE

In questi giorni è iniziata la schiusura delle larvette della Cocciniglia di San José (CSJ). La presenza di questo parassita nei frutteti e sulle piante ornamentali è in aumento. Dove si costatano forti attacchi o dove l'anno scorso è stata notata la sua presenza sui frutti alla raccolta, si potrà intervenire con Reldan o Pyrinex.

Ai vivaisti consigliamo di intervenire sulle piante ornamentali e da frutta ospiti della CSJ (cotogno del Giappone, Cotoneaster, biancospino, cotogno, melo, susino, ciliegio amarasco, albicocco, pesco, mandorlo, lauroceraso, Pyracantha, pero, ribes, cassis, uva spina, rosa, salice, sorbo, sinforicarpo) con Reldan 40 o Pyrinex.

FRUTTICOLTURA : TICCHIOLATURA

Nei frutteti la ticchiolatura è ora ben visibile sulle foglie e in parte anche sui frutticini. Invitiamo i frutticoltori a sospendere l'impiego dei prodotti inibitori della sintesi degli steroli (ISS), delle strobilurine e della dodina per evitare l'insorgere di resistenze o la perdita di efficacia e sostituirli con prodotti quali Delan, captano, folpet che nel contempo prevengono le malattie che si sviluppano durante la conservazione quali il marciume lenticellare e la Gleosporiosi.

CAMPICOLTURA: AGROTIDI

Controllare regolarmente le colture di mais e altre colture che si trovano ad uno stadio di sviluppo sensibile agli attacchi delle larve di agrotidi.

VITICOLTURA : ATTENZIONE ALLE MALATTIE, INSETTI

Ricordiamo ai viticoltori che si possono effettuare trattamenti con fungicidi durante la fioritura . Si eviti per contro di aggiungere degli insetticidi che potrebbero uccidere gli insetti impollinatori. Invitiamo a proseguire la lotta contro la peronospora, l'oidio e, dove necessario, contro il black-rot, assicurando una regolare copertura sia delle foglie, sia dei grappolini, tenendo conto della crescita vegetativa, delle precipitazioni e delle materie attive utilizzate. Trattare su foglie completamente asciutte. Dopo il trattamento, per garantire l'efficacia del prodotto, non dovrebbe piovere per almeno 2 ore.

Poltiglie non utilizzate non devono essere lasciate una notte nel secchio prima di essere irrorate in quanto perdono la loro efficacia.

Il volo delle tignole dell'uva di prima generazione è terminato e l'attività del fitofago in questione, in generale, è molto scarsa.

Servizio fitosanitario