



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: 091 / 814 35 62
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 25

Bellinzona: 16 agosto 2005

VITICOLTURA: RISPETTARE I TERMINI PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI, FLAVESCENZA DORATA E LEGNO NERO

Ricordiamo che l'ultimo termine per l'utilizzazione della maggior parte dei prodotti fitosanitari in viticoltura è il 15 di agosto.

Gli unici prodotti che si possono utilizzare dopo questa data e fino al 31 agosto sono quelli contenenti unicamente del rame per un eventuale trattamento di copertura per proteggere le femmine.

Le reti di protezione contro gli uccelli vanno controllate regolarmente per liberare eventuali animali catturati.

Nei focolai di flavescenza dorata rinvenuti lo scorso anno a Pedrinete sono già state riscontrate anche quest'anno delle viti colpite da questa malattia, causate da infezioni dello scorso anno, sui vitigni Gamaret, Cabernet sauvignon e Doral.

I sintomi della malattia sono ora ben visibili ed è quindi molto importante controllare tutti i vigneti del cantone e segnalare al Servizio fitosanitario eventuali casi sospetti.

I sintomi della Flavescenza dorata sono simili a quelli del legno nero, un'altra malattia da fitoplasmi, già ben presente in tutto il cantone e anche in Mesolcina. Anche se meno epidemica della flavescenza dorata, la malattia del legno nero sta provocando in alcuni vigneti di Chardonnay dei danni non trascurabili.

Le viti con sintomi manifesti della flavescenza dorata e del legno nero devono essere estirpate in quanto non esiste un metodo di lotta diretta contro queste malattie.

Presso il Servizio fitosanitario è a disposizione una scheda tecnica sulla flavescenza dorata.

È importante ricordare i sintomi della malattia:

Foglie: la lamina fogliare si ispessisce, assumendo una consistenza cartacea e si accartocchia verso il basso con la tipica forma a triangolo. Le foglie presentano una colorazione gialla più o meno intensa su vitigni a uva bianca, oppure violacea-vinosa su varietà a frutto rosso. Le colorazioni possono essere limitate a un solo settore della foglia oppure interessare tutta la lamina fogliare comprese le nervature.

Tralci: rimangono erbacei con parziale e irregolare lignificazione. Di consistenza gommosa, tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. Disseccando i tralci assumono una colorazione nerastra.

Grappoli: appassiscono fino a seccare completamente oppure in caso di infezioni di più anni non appaiono nemmeno.

CAMPICOLTURA: CENCIO MOLLE

Nel Mendrisiotto sono presenti focolai di cencio molle (*Abutilon theophrasti*). Raccomandiamo l'eliminazione di questa malerba dato che, una volta insediata nelle colture, è difficile da controllare.

Per le altre infestanti quali la sorghetta consigliamo di effettuare uno sfalcio delle piante che si trovano ai bordi dei campi per impedire la formazione di semi. Ricordiamo che questa infestante ospita il virus del mosaico nano che viene trasmesso dagli afidi alle colture di mais.

FRUTICOLTURA: CARPOCAPSA

Alla raccolta delle mele e delle pere controllare la presenza di penetrazioni nei frutti dovuti alla carpocapsa. Qual'ora si dovessero verificare degli attacchi importanti nonostante il corretto utilizzo di prodotti ICI e RCI rivolgetevi al nostro servizio.

Servizio fitosanitario