



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
 Fax: 091 / 814 44 64
 Risponditore: non in funzione
 luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
 www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 4

Bellinzona: 13 febbraio 2006

CAMPICOLTURA: OMOLOGAZIONE PRODOTTI FITOSANITARI
nuove omologazioni (N), modifiche (M), estensione (E)

		Nome prodotto	Ditta	Materia attiva	Coltura	Dosi	Stadio fenologico	Osservazioni
N	F	Acanto Prima	Syngenta	ciprodinil 30% picoxistrobin 8 %	Orzo: Oidio Elmintosporiosi Rincosporiosi Efficacia parziale: Ramularia	2.5 kg/ha	BBCH 31-51 BBCH 31-51 BBCH 31-51 BBCH 39-51	1 trattamento per parcella e per anno
N	F	Acanto Prima	Syngenta	ciprodinil 30% picoxistrobin 8 %	Frumento: Mal del piede Oidio Ruggine bruna Septoria delle foglie Septoria della spiga	2.5 kg/ha	BBCH 30-32 BBCH 31-61 BBCH 37-61 BBCH 37-51 BBCH 51-61	1 trattamento per parcella e per anno
N	F	Acanto Prima	Syngenta	ciprodinil 30% picoxistrobin 8 %	Segale: Ruggine bruna Septoriosi delle foglie Rincosporiosi	2.5 kg/ha	BBCH 37-51 BBCH 37-51 BBCH 37-51	1 trattamento per parcella e per anno
N	F	Acanto Prima	Syngenta	ciprodinil 30% picoxistrobin 8 %	Triticale: Septoria delle foglie Rincosporiosi	2.5 kg/ha	BBCH 37-51 BBCH 37-51	1 trattamento per parcella e per anno
E	E	Speleo	Du Pont	flupirsulfuron (33%) metsulfuron-metil (33%)	Spelta: dico- e monocotiledoni annuali	25 g/ha		
N	I	Rimon	Cemag	novaluron (9.26%)	Patate: Dorifora	0.2 l/ha	Periodo di attesa : 3 settimane	Pericoloso per la covata delle api. Trattare fuori dal periodo di volo delle api. Non deve entrare in contatto con piante in fiore o mellifere. Non trattare in prossimità di corsi d'acqua. Massimo 2 trattamenti per anno e per parcella.
N	F	Proline	Bayer	protioconazol (25% 250 g/l)	Orzo: Oidio Elmintosporiosi Rincosporiosi Ruggine nana Ramularia	0.8 l/ha	BBCH 31-51 BBCH 31-51 BBCH 31-51 BBCH 31-51 BBCH 39-51	
N	F	Proline	Bayer	protioconazol (25% 250 g/l)	Frumento: Mal del piede Oidio Ruggine bruna Ruggine gialla Septoria delle foglie Ramularia Septoria delle spighe Fusariosi	0.8 l/ha	BBCH 30-32 BBCH 31-61 BBCH 37-61 BBCH 31-61 BBCH 37-51 BBCH 39-51 BBCH 51-61 BBCH 61-65	
N	F	Proline	Bayer	prothioconazol (25% 250 g/l)	Segale: Ruggine bruna Septoria delle foglie	0.8 l/ha	BBCH 37-61 BBCH 37-61	
N	F	Proline	Bayer	prothioconazol (25% 250 g/l)	Triticale: Oidio Ruggine bruna Ruggine gialla Septoria delle foglie Rincosporiosi Fusariosi	0.8 l/ha	BBCH 31-61 BBCH 37-61 BBCH 31-61 BBCH 37-51 BBCH 37-61 BBCH 61-65	

N	E	Gesal Hirsens-Vertilger	Omya	fenoxaprop-P-etil (69g/l)	Cereali: (eccetto avena): monocotiledoni	0.8 - 1.2 l/ha	Per analogia	
N	E	Hysan	Omya	pendimetalin (400 g/l)	Per analogia			
N	E	Fox	Omya	bifenox (480 g/l)	Fumento autunnale, orzo autunnale, segale autunnale: dicotiledoni	1.5 l/ha	Stadio 13-25 (BBCH)	In miscela la dose può essere ridotta (075 - 1 l/ha)
N	E	Fortuna	Omya	bromoxinil (100 g/l) ioxinil (100 g/l) fluroxipir (100 g/l)	Cereali: dicotiledoni annuali	1.2 - 1.8 l/ha	In primavera, in postlevata (fino allo stadio 31)	
N	E	Fedor	Bayer	flufenacet (42%) métribuzin (14%)	Fumento, orzo, segale, triticale, patate, soia: dicotiledoni e monocotiledoni	0.3 - 0.5 kg/ha (primavera) 1 - 1.4 kg/ha (prelevata)		
N	E	Cossack	Bayer	iodosulfuron (3%) mesosulfuron (3%)	Fumento autunnale, segale autunnale, triticale: frumento primaverile: dicotiledoni e monocotiledoni annuali	0.2 - 0.3 kg/ha 0.2-0.25 kg/ha	Primavera (stadio 13-30)	
E	F	Chlorothalonil Omya	Omya	chlorotalonil	Orzo: Ramularia	1.5 l/ha	In miscela con Sirocco 1.5 l/ha oppure con Flamenco Plus 2.3 l/ha	Ramularia: BCH 39-51: dall'apparizione dei sintomi sulle tre ultime foglie
E	E	Husar	Bayer	iodosulfuron (5%)	Spelta: dicotiledoni e monocotiledoni	0.15 - 0.2 kg/ha	Stadio 13-32 (BBCH)	
E	E	Frontier 900 EC	BASF/Leu+Gygax	demetenamid (900 g/l)	Girasole: dicotiledoni e monocotiledoni annuali	1.2 l/ha (prélevée)	In miscela con Linuron	
E	E	Linuron LG	Leu+Gygax	linuron (50%)	Soia e girasole: dicotiledoni e monocotiledoni annuali	0.6 - 1 kg/ha	In miscela con Frontier 900 EC oppure con Frontier X2	
E	E	Lontrel 100	Syngenta	clopiralid (100 g/l)	Barbabietole: ricacci di girasole, dicotiledoni	1 - 1.2 l/ha	Non foraggiare il bestiame da latte con le barbabietole trattate	
E	E	Reglone	Staehler, Syngenta	Diquat (200 g/l)	Patate (frascame): disseccante	2.5 l/ha	Applicazioni sequenziali (2 X 2,5 l/ha)	Non trattare alla sera o in caso di tempo secco
E	E	Lotus	BASF/Leu+Gygax	cinidon-etil (200g/l)	Patate per il consumo e per l'afforaggiamento: disseccante	0.75 l/ha	In miscela con olio minerale (5l/ha)	

Tipo: F=fungicida, I=insetticida, E=erbicida