Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: 091/ 814 35 62
luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 19 **Bellinzona: 6 giugno 2006**

FRUTTICOLTURA E PIANTE ORNAMENTALI: COCCINIGLIA DI SAN JOSE

In questi giorni è iniziata la schiusura delle larvette della Cocciniglia di San José. Il fitofago in questione non è più considerato un organismo di quarantena tuttavia mantiene intatta la sua pericolosità per cui, dove l'anno scorso al momento della raccolta delle mele e delle pere è stata notata la presenza si potrà intervenire con Reldan o Pyrinex. Piante fortemente infestate dal parassita vanno estirpate.

Ai vivaisti consigliamo, in caso di necessità, di intervenire sulle piante ornamentali ospiti della Cocciniglia di San José con Reldan o Pyrinex.

FRUTTICOLTURA : FRUTTA A NOCCIOLO E A GRANELLA

Per quel che concerne la frutta a nocciolo prossima alla maturazione è molto importante rispettare il periodo di attesa tra l'ultimo trattamento, sia fungicida, sia insetticida e la raccolta tuttavia, continuare i trattamenti contro le principali malattie: vaiolatura, oidio e cilindrosporiosi. Sul susino, si potrà intervenire contro la ruggine delle foglie con Delan, Dithianon, Flint o Slick.

Per la frutta a granella continuare i trattamenti contro la ticchiolatura combinati con quelli contro l'oidio.

FUOCO BATTERICO: CONTROLLARE ATTENTAMENTE LE PIANTE OSPITI

A parte il *Cotoneaster salicilolius* che è in piena fioritura, la fioritura delle altre piante ospiti del fuoco batterico è terminata. Rammentiamo quali sono le piante ospiti: melo, pero, cotogno, cotogno del Giappone, cotognastro, piracanta, biancospino, sorbo, fotinia, nespolo, nespolo del Giappone e pero corvino.

I sintomi della malattia sono l'appassimento dei germogli che si ripiegano a manico d'ombrello, il disseccamento di rami e rametti, le necrosi su foglie, le infiorescenze e i frutticini che restano sulla pianta mummificati.

La previsione basata sul programma Maryblyt su eventuali attacchi del batterio, indica che le condizioni propizie all'infezione si sono manifestate nei giorni 22–24 aprile (Sopraceneri), 26–28 aprile (Sottoceneri) e 13–14 maggio (sia Sopra- che Sottoceneri) per cui i sintomi della malattia potrebbero già essere ben visibili. Dato che si tratta di un organismo di quarantena di particolare pericolo invitiamo tutti coloro che trovano delle piante ospiti con sintomi sospetti di volercelo segnalare e di non toccare il materiale.

Servizio fitosanitario