



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85

Fax: 091 / 814 44 64

Risponditore: 091 / 814 35 62

luigi.colombi@ti.ch roberto.brunetti@ti.ch

**Bollettino fitosanitario n: 13**

**Bellinzona: 23 aprile 2007**

### **VITICOLTURA: ACARO ERIOFIDE DELL'ERINOSI**

In numerosi vigneti si costata la presenza di erinosi. In generale non si deve trattare ma, dove l'attacco dell'acaro eriofide è esteso e sta bloccando la vegetazione, si potrà intervenire con un acaricida.

### **MAGGIOLINO**

Quest'anno il volo del maggiolino dovrebbe interessare il Sottoceneri (bollettino fitosanitario n 11 del 10 aprile 2007) tuttavia segnaliamo un volo anomalo sul Piano di Magadino per cui, si dovrà prestare attenzione ai nuovi impianti sia di piante da frutta sia di barbatelle. Controllare la presenza di adulti, in modo particolare su ciliegi e noci che sono le piante maggiormente appetite. Falcciare l'erba solo alla fine del volo.

### **CAMPICOLTURA: PATATE**

La fitoftora rappresenta la malattia più grave per la coltura della patata.

Le patate precoci coltivate sotto protezione vanno trattate a partire dal ritiro della plastica.

Sulle patate coltivate sotto plastica e sulle patate per la produzione di seme non si devono impiegare i prodotti sistemici del gruppo dei fenilammidi (Epoque, Ridomil Gold).

Le infezioni e le successive sporulazioni del fungo della malattia avvengono quando sull'arco delle 24 ore si verificano le seguenti condizioni:

1. precipitazioni superiori a 0.1 mm in 6 ore;
2. umidità relativa superiore al 90% per almeno 6 ore consecutive;
3. temperatura media della giornata di 10°C.

Le strategie di lotta contro la fitoftora della patata si basano sulle seguenti regole generali:

ripetere il trattamento dopo 7 giorni (se si impiegano prodotti di contatto) fino a 10 giorni (se si utilizzano prodotti parzialmente sistemici) oppure dopo una precipitazione dilavante di 20-30 mm a dipendenza del prodotto usato.

Raccomandazioni:

- se nelle vicinanze del campo non sono presenti infezioni, impiegare prodotti di contatto o parzialmente sistemici;
- se nei dintorni del campo ci sono delle infezioni, impiegare prodotti parzialmente sistemici, aggiungendo un prodotto di contatto;
- se l'attacco è presente sulla parcella effettuare un trattamento con un prodotto parzialmente sistemico e ripeterlo dopo 4-5 giorni. Non utilizzare prodotti sistemici se già utilizzati precedentemente nella stessa parcella per evitare l'insorgere di resistenze.

I prodotti sistemici si possono utilizzare 3 volte per stagione, al massimo fino alla fine di luglio.

**Ricordiamo che è in funzione il risponditore per i bollettini fitosanitari collegato al numero telefonico 091/814 35 62**

**Servizio fitosanitario**