



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: in funzione
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 11

Bellinzona: 7 aprile 2008

VITICOLTURA: CONTROLLO PRESENZA NOTTUE

Si segnalano dei danni causati dalle nottue in alcuni vigneti in modo particolare nel Bellinzonese e nel Locarnese sulla sponda destra del fiume Ticino. Invitiamo quindi a effettuare il controllo delle gemme e solamente se viene superata la soglia del 3% di gemme mangiate dalle nottue, si potrà intervenire con un prodotto appropriato (Vedi guida alla protezione fitosanitaria in viticoltura 2008)

FRUTTICOLTURA

FRUTTA A GRANELLI : TICCHIOLATURA – OIDIO – CONTROLLO PRESENZA AFIDI

È importante proseguire con i trattamenti preventivi contro la ticchiolatura e l'oidio delle mele e delle pere tenendo in considerazione la crescita vegetativa, la varietà, le condizioni meteorologiche e il tipo di prodotto utilizzato.

Controllare la presenza dell'afide galle rosse e dell'afide verde non migrante.

FRUTTA A NOCCIOLO: INTERVENTI DOPO LA FIORITURA

Albicocco: dopo la caduta dei petali

Contro la monilia: Rovral, Switch, Chorus, Teldor WG 50.

In caso di forti attacchi dovuti a monilia e vaiolatura: Amistar, Duotop.

Monilia, vaiolatura, oidio: Rondo DG, Flint, Tega, Alto 100 SL, Slick, Bogard, Pomstar C, Systhane C WG, Colt Elite, Pomstar C, Veto Top.

Pesco: prima della caduta dei calici fiorali.

Oidio, vaiolatura: zolfo bagnabile oppure utilizzare gli stessi prodotti indicati per l'albicocco.

Susino: in caso di fioritura prolungata e di pioggia

Varietà sensibili alla monilia: Amistar, Rovral, Switch oppure un ISS oppure ancora captano + ISS.

Alla caduta dei petali e solo dopo un approfondito controllo, se necessario, si aggiungerà:

Afidi: Gazelle, Pirimicarb, Pirimor, Aztec, Actara, Alanto.

Oplocampa: esteri fosforici oppure Quassan, Evisect S, Actara, Gazelle, Alanto.

Ciliegio: alla caduta dei petali

Vaiolatura: Amistar, Captano (diversi prodotti), Delan, Folpet (diversi prodotti) o ISS + Captano.

In caso di ripetute precipitazioni ripetere il trattamento dopo la caduta dei calici fiorali.

Rinnoviamo l'invito a proteggere le api e gli altri insetti impollinatori. Non effettuare trattamenti insetticidi, acaricidi ed erbicidi durante il periodo della fioritura degli alberi da frutta.

Attenzione anche alla presenza di erbe spontanee in fiore.

ATTENZIONE ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO

Rendiamo attenta tutta la popolazione che continua l'uscita delle larve della processionaria dai nidi. Visto il pericolo provocato dai peli urticanti di questi fitofagi, che possono causare dolorose infiammazioni se vi è un contatto con la pelle, invitiamo a non avvicinarsi sotto le piante infestate e in prossimità delle lunghe file formate da queste larve. Vi è pericolo di contagio anche per gli animali domestici.