



Servizio fitosanitario cantonale
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57
Fax: 091 / 814 44 64
Risponditore: 091 / 814 35 62
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch
www.ti.ch/agricoltura

Bollettino fitosanitario n: 17

Bellinzona: 11 maggio 2009

VITICOLTURA: PERONOSPORA, OIDIO, ERINOSI

Le precipitazioni cadute durante lo scorso fine settimana, possono avere reso possibile le infezioni primarie della peronospora anche nelle zone più tardive del cantone.

Invitiamo quindi a voler iniziare la lotta preventiva contro la peronospora e l'oidio, nel corso di questa settimana, anche nei vigneti più tardivi.

In diversi vigneti si costata la presenza, in certi casi anche abbastanza forte, di erinosi.

In generale non bisogna trattare, ma, dove l'attacco di questo acaro eriofide è molto esteso e sta bloccando la vegetazione, si potrà intervenire con un acaricida.

In questi giorni vengono ancora segnalati al nostro servizio dei vigneti abbandonati. Ricordiamo che la Sezione dell'agricoltura può esigere l'estirpazione di ceppi di vite che costituiscono manifesti focolai d'infezione quando il proprietario non provvede alle necessarie operazioni colturali, come pure quando non è più possibile rimediare in altro modo.

DESCRIZIONE DI ALCUNE PIANTE ORNAMENTALI (specie sostitutive alle piante ospiti del fuoco batterico)



Hebe pinquifolia

Descrizione: arbusto sempreverde originario dell'Australia e Nuova Zelanda. Il genere Hebe comprende svariate specie che si dividono in due categorie, quelle con fogliame grande o quelle con foglia piccola.

Hebe pinquifolia appartiene alla categoria di sempreverdi a foglia piccola, coriacea, verde-blu su steli porpora.

Ha un portamento prima eretto poi prostrato.

Tra maggio e giugno vengono prodotti fiorellini bianchi su fitte spighe ascellari.

All'interno del genere Hebe, la maggior parte delle specie produce una seconda fioritura nel periodo autunnale ma solitamente la presenza di una massiccia fioritura estiva deprime la fioritura autunnale. Altre specie invece, avendo una fioritura insignificante, vengono utilizzate solo come bordure sempreverdi.

Queste piante prediligono un'esposizione soleggiata o ad ombra parziale. Se posizionate in piena ombra avremo sicuramente una fioritura quasi inesistente.

Vantaggi e Svantaggi: Hebe a foglia grande hanno una resistenza al gelo scarsa o moderata e fioritura in genere abbondante, invece Hebe a foglia piccola presentano resistenza al gelo notevole e fioritura in genere scarsa.

Possibili avversità: piante resistenti anche se a volte potrebbero essere colpite da attacchi di afidi.

IN FIORE TROVIAMO...

Cotinus coccygria (Scotano o albero della nebbia): con infiorescenze costituite da piccoli fiorellini gialli poco appariscenti. Singolare è l'aspetto che l'infiorescenza assume in estate, i peduncoli fiorali diventano piumosi formando un pennacchio molto caratteristico. Risultano inoltre decorative le cultivar con foglie rosso porpora, marrone o giallo.

Kolkwitzia amabilis : con fiori piccoli ma molto numerosi, di un rosa fresco molto grazioso.

Pittosporum tobira (Pittosforo): arbusto di piccole dimensioni originario della Cina con fiori bianchi o giallo crema, molto profumati.

Pyracantha coccinea (Agazzino): produce innumerevoli piccoli fiori a stella, di colore bianco, profumati, seguiti in autunno da piccoli frutti tondeggianti di colore arancione. Ricordiamo che la *Pyracantha* è pianta ospite del Fuoco batterico.

Rubus fruticosus (Mora): fioritura bianco-rosa che precede la comparsa del frutto (piccole drupe) in agosto-settembre.