



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85  
Fax: 091 / 814 44 64  
Risponditore: non in funzione  
luigi.colombi@ti.ch cristina.marazzi@ti.ch  
marta.rossinelli@ti.ch www.ti.ch/agricoltura

**Bollettino fitosanitario n: 6**

**Bellinzona: 14 febbraio 2011**

## **PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LA FRUTTICOLTURA: NOVITÀ 2011**

### **Fungicidi**

#### **Estensione di omologazione**

**Armcarb** (Stähler), bicarbonato di potassio, ha un'azione parziale anche contro la **Moniliosi su fiori d'albicocco, applicato durante la fioritura, 0.3%, 4.8 kg/ha**

#### **Prodotti analoghi**

**Dallas** (Sintagro), penconazol (ISS), è analogo a Topas Vino (Syngenta)

**Ortiva** (Syngenta), asoxystrobin, è analogo a Amistar

**Sico EC** (Bayer), difenconazol (ISS), è analogo a Slick (Syngenta)

Il prodotto **Pomstar Viti** (Schneider) rimpiazza Pomstar C

### **Insetticidi e acaricidi**

<b>Nome commerciale</b>	<b>Materia attiva</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Bersaglio</b>	<b>Osservazioni</b>
<b>Movento arbo</b> (Bayer)	spirotetramat	chetoenolo	afidi, cocciniglie, psille	Concentrazione: a dipendenza del fitofago considerato; Dose: idem; Termine d'attesa: 3 settimane; Applicazione: max. 2 tratt./anno; (1 solo tratt. con la dose massima) <b>Attenzione:</b> possibili allergie, indossare guanti di protezione!
<b>Kanemite</b> (Stähler)	acechinocyl	acaricida	ragnetti (solo della frutta a granella)	Concentrazione: 0.1125%; Dose: 1.8 l/ha; Termine d'attesa: 3 settimane; Applicazione: max. 1 tratt./anno dopo la fioritura (BBCH 69); <b>Attenzione:</b> distanza minima dalle acque di superficie: 20 m; utilizzabile solo nei frutteti intensivi; tossico per le api.

### **Restrizioni**

Per il prodotto **Pyrinex**, la distanza minima da rispettare dalle acque di superficie è di **100 m**.

I prodotti a base di **diazinon** per la frutta a granella possono essere utilizzati solamente fino alla fioritura

I prodotti a base di **dimetoato** possono essere utilizzati unicamente contro la mosca della ciliegia allo 0.04% con un'omologazione speciale fino al 31.7.2011

### **Estensione di omologazione**

**Actara** (Syngenta), thiametoxam, può essere utilizzato anche contro la **mosca della ciliegia, allo 0.02%, 0.32 kg/ha, max 1 tratt./anno, solamente nei frutteti commerciali; termine d'attesa: 3 settimane**

**Gazelle SG** (Stähler), acetamiprid, può essere utilizzato anche contro la **mosca della ciliegia, allo 0.02%, 0.32 kg/ha, max 2 tratt./anno, termine d'attesa: 2 settimane**

### Prodotti analoghi

**Bazooka** (Schneider), imidacloprid, è analogo a Confidor

**Hagar WG** (Schneider), fenoxycarb, è analogo a Insegar (Syngenta).

**Niagara** (Sintagro), clofentezin, è analogo a Apollo (Syngenta)

### Prodotti sospesi e ritirati dal mercato:

**Evisect** (Syngenta), **Aztec** (Omya), **Acarac** (Syngenta): termine di vendita: 15.09.2011; utilizzabili fino al 15.09.2012

**Per tutti i prodotti a base di dimetoato** (diverse ditte), divieto d'utilizzazione immediato (eccezione: mosca della ciliegia, vedi tabella)

**Perfekthion** (Syngenta), dimetoato, è ancora utilizzabile contro la mosca dell'olivo

### Erbicidi

Nome commerciale	Materia attiva	Gruppo	Bersaglio	Osservazioni
<b>Oscar</b> (Leu-Gygax)	diuron + glyphosat	erbicidi fogliare e residuale	dicotiledoni e monocotiledoni	dose: 8-10 l/ha; applicazione: dal 4°anno <b>Attenzione:</b> si rende attenti gli utilizzatori che monocotiledoni e dicotiledoni pluriennali possono ricrescere. Da effettuarsi quando non sono previste precipitazioni per almeno 6 ore dopo il trattamento; max. 500 l acqua/ha

### Prodotti analoghi

**Proper Flo** (Schneider), è analogo a Kerb flo

**Servizio fitosanitario**