



Servizio fitosanitario cantonale

Viale Stefano Franscini 17

6501 Bellinzona

Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57

Fax: 091 / 814 44 64

Risponditore: non in funzione

servizio.fitosanitario@ti.ch

www.ti.ch/fitosanitario

Bollettino fitosanitario n: 4

Bellinzona: 30 gennaio 2017

GENERALE

Iniziamo con questo bollettino ad elencare le novità dei prodotti fitosanitari per il 2017 partendo dalla viticoltura.

Ricordiamo che le informazioni concernenti le colture orticole si possono trovare sul bollettino INFO colture orticole e sono disponibili sul sito www.dataphyto.acw-online.ch.

Per maggiori dettagli relativi ai prodotti, vi invitiamo a visitare il sito internet www.psm.admin.ch.

VITICOLTURA

PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LA VITICOLTURA: NOVITÀ 2017

Fungicidi-novità

| Prodotto (ditta) | Materia attiva (gruppo) | Bersaglio | Osservazioni |
|--------------------------------|--|--|---|
| Ampexio (Syngenta) | mandipropamid (CAA, nuovo) + zoxamid | Peronospora concentrazione.:0.0375% dose: 0.6 kg/ha | Mass. 3 trattamenti annui e non più di 2 consecutivi; mantenere 20 m dalle acque di superficie; rispettare una zona tampone con copertura vegetale totale di ameno 6 m; preparazione della poltiglia: portare i guanti di protezione. |
| Escort (Omya) | cymoxanil (33%)+ zoxamide (33%) | Peronospora concentrazione: 0.028% dose: 0.45 kg/ha | Mass. 3 trattamenti annui con prodotti a base di zoxamid; mantenere 6 metri dalle acque di superficie; preparazione della poltiglia: portare i guanti di protezione; applicazione della poltiglia: guanti e tuta di protezione termine per entrare nel vigneto dopo il trattamento: 48 ore (o tenuta di protezione) |
| Sercadis (BASF) | fluxapyroxade (SDHI) | Oidio parziale: black rot concentrazione.:0.0095% dose: 0.15 l/ha | Mass 3 trattamenti annui; preparazione poltiglia: portare guanti e tuta di protezione. |
| Valis F (Leu + Gyax) | valifenalate (CAA) + folpet | Peronospora parziale: marciume grigio (<i>Botrytis cinerea</i>) concentrazione 0.125% dose 2 kg/ha | Mass. 3 trattamenti. annui con prodotti contenenti CAA; 20 m dalle acque di superficie; preparazione poltiglia: portare guanti, tuta, maschera e occhiali di protezione; applicazione poltiglia: guanti e tuta di protezione; termine per entrare nel vigneto: 48 ore (o tenuta di protezione) |

Le distanze dalle acque di superficie indicate possono essere ridotte applicando delle misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.

Fungicidi - omologazione per analogia

| Prodotto (ditta) | Materia attiva | Osservazioni |
|----------------------------|----------------|--|
| Atollan (Stähler) | ditianon | Analogo a Delan |
| Alfil WG (Sintagro) | fosetyl-Al | Analogo a Alial 80 WG |
| Espiro (Omya) | pyrimethanil | Analogo a Scala (termine utilizzo 31.01.2018), Papyrus, Pyrus 400 SC |

Fungicidi - autorizzazione revocata

| Nome commerciale | Materia attiva | Termine utilizzo | Osservazioni |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Captan 50 (Omya) | captano | 31.07.2017 | |
| Copper Elite (Omya) | idrossido di rame | 31.07.2017 | |
| Cupravit blau (Bayer) | idrossido clorocalcico di rame | 31.07.2017 | |
| Duotop (Stähler) | triflumizolo | 31.07.2017 | |
| Cuivre 50 (diversi) | ossicloruro di rame | 31.07.2017 | |
| Oxykupfer 50 (Stähler) | ossicloruro di rame | 31.07.2017 | sostituito con Oxykupfer 35 |
| Pomstar Viti (Schneider) | ossicloruro di rame | 31.07.2017 | |
| Vitigran 50 (Omya) | ossicloruro di rame | 31.07.2017 | sostituito con Vitigran 35 |

Fungicidi - riesame mirato e nuove prescrizioni per l'utilizzo (estratto)

| Nome commerciale | Materia attiva | Riesame mirato e nuove prescrizioni d'utilizzo |
|---------------------------------|----------------|--|
| Quadris Max | azossistrobina | 20 m dalle acque di superficie; come protezione dal dilavamento: zona tampone inerbita su tutta la superficie di 6 m. |
| Topas Vino | penconazolo | per le indicazioni rorsore parassitario, escoriosi e black rot: riduzione a mass. 40 g di m. a./ha come per oidio e miscuglio obbligatorio con folpet (0.1%); proibito in zona S2. |
| Differenti prodotti (es. Delan) | ditianon | non per uva da tavola; mass 8 trattamenti annui (residui); 20 m dalle acque di superficie; protezione dal dilavamento: zona tampone inerbita su tutta la superficie di 6 m. |
| Pyrus 400 SC, Papyrus) | pyrimethanil | 20 m dalle acque di superficie |

Sono in fase di riesame :

Benthiavalicarb, bupirimat, difenoconazoli, fenhexamidi, myclobutanil, penconazoli, thiabendazoli, azozystrobin

Ricordiamo che i risultati dei riesami mirati sono disponibili nel sito dell'UFAG:

<https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/zugelassene-pflanzenschutzmittel.html>

Insetticidi e acaricidi – termine per l'utilizzo e la svendita

| Prodotto | Materia attiva | Termine (T.) | Osservazioni |
|---------------------|-----------------------|--|---|
| Chlorpyrifos methyl | chlorpyrifos-methyl | T. utilizzo: 31.07.2017 | Fine autorizzazione |
| Reldan 40 | chlorpyrifos methyl | T. utilizzo: 30.11.2017 | sostituito con Reldan 22 |
| Trevi, Matarcar | hexythiazox | T. utilizzo: 31.07. 2017 | sostituito da Credo e Nissostar |
| Nomolt | teflubenzuron | T. utilizzo: 31.07.2017 | ritiro da tutti gli usi in viticoltura |
| Pyrinex | chlorpyrifos-éthyl | T. svendita: 01.09.2017 T. Utilizzo: 01.09.2018 | valido per le indicazioni tignole dell'uva, cicalina verde e <i>Scaphoideus titanus</i> . Il prodotto resta autorizzato prima della fioritura (BBCH 55) contro tripidi, piralide e cimice verde. |

Servizio fitosanitario