



<b>Servizio fitosanitario cantonale</b>	Telefono: 091 / 814 35 86 / 85 / 57
<b>Viale Stefano Franscini 17</b>	Fax: 091 / 814 44 64
<b>6501 Bellinzona</b>	Risponditore: 091 / 814 35 62 Servizio.fitosanitario@ti.ch www.ti.ch/fitosanitario

**Bollettino fitosanitario n: 17**

**Bellinzona: 27 aprile 2017**

## **VITICOLTURA**

### **PRIMO TRATTAMENTO CONTRO LA PERONOSPORA E L'OIDIO**

Le precipitazioni cadute gli scorsi giorni, potrebbero aver reso possibili le infezioni primarie della peronospora.

Inoltre tutte le stazioni meteo posizionate in Ticino (a Giornico, Malvaglia, Biasca, Gudo, Camorino, Cugnasco, Verscio, Cademario, Sessa, Corteglia e Besazio), segnalano delle possibili forti infezioni primarie della peronospora.

Vista la situazione consigliamo di effettuare il primo trattamento contro la peronospora, abbinato alla lotta preventiva contro l'oidio, appena possibile e di seguire l'evoluzione delle malattie al sito [www.agrometeo.ch](http://www.agrometeo.ch).

Considerate comunque le diversità di crescita vegetativa e di microclima tra le varie zone del Cantone, spetta al viticoltore decidere, grazie anche alla sua esperienza, il giusto momento di intervenire, tenendo in considerazione la sensibilità della parcella alle malattie.

Ricordiamo che l'indice dei prodotti fitosanitari per la viticoltura 2017 può essere richiesto alle varie sezioni della Federviti oppure presso il Servizio fitosanitario o scaricato direttamente dal sito [www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario). È a disposizione in forma cartacea anche la guida fitosanitaria per la viticoltura 2017/2018, dove si possono trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare un trattamento fitosanitario in modo corretto.

È molto importante l'applicazione di una strategia di lotta che eviti il più possibile l'insorgere di resistenze.

Le irroratrici devono essere in perfetto stato. Tutti gli organi della vite devono essere bagnati accuratamente, rispettando scrupolosamente il dosaggio del prodotto in funzione dello stadio fenologico riscontrato nel vigneto o del volume fogliare. Trattare su foglie completamente asciutte e con tempo stabile. Dopo il trattamento non deve piovere per almeno 2 ore per garantire l'efficacia del prodotto.

Allo scopo di individuare i primi focolai di peronospora e di oidio e poter così avvertire della pressione esercitata da queste avversità nel Cantone Ticino e nella Mesolcina, invitiamo i viticoltori a voler segnalare al Servizio fitosanitario o all'Ufficio della consulenza agricola l'eventuale apparizione di queste malattie.

### **DROSOPHILA SUZUKII**

La scheda aggiornata con le raccomandazioni per il 2017 è a disposizione sul nostro sito.

**Servizio fitosanitario**