



**Servizio fitosanitario cantonale**  
**Viale Stefano Franscini 17**  
**6501 Bellinzona**

Telefono: 091 / 814 35 57/85/86/87  
Fax: 091 / 814 81 65  
[servizio.fitosanitario@ti.ch](mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch)  
[www.ti.ch/fitosanitario](http://www.ti.ch/fitosanitario)

**Bollettino fitosanitario n: 25**

**Bellinzona: 1 luglio 2019**

## VITICOLTURA

### **SITUAZIONE GENERALE**

La fioritura del Merlot è terminata anche nelle zone più tardive. La maggior parte dei vigneti si trova in uno stadio fenologico di sviluppo acini, mentre quelli più precoci si avvicinano alla chiusura del grappolo.

La situazione fitosanitaria è generalmente buona. Si riscontrano alcuni attacchi di peronospora principalmente su foglia e sporadicamente sui grappoli. Le condizioni calde e umide di questo periodo, soprattutto nei vigneti poco ventilati e soggetti a bagnature fogliari notturne, possono favorire ancora infezioni secondarie. Nella fase di accrescimento acini queste infezioni tardive possono dare origine alla cosiddetta peronospora larvata che si manifesta con una colorazione bruno-violacea e un arresto della crescita degli acini che avvizziscono e seccano. Può colpire singoli acini o una parte del grappolo più o meno estesa.

Sono stati osservati forti attacchi di oidio su grappolo in alcune zone del Cantone, soprattutto su varietà sensibili. **ATTENZIONE: il portale agrometeo ([www.agrometeo.ch](http://www.agrometeo.ch)) segnala un rischio oidio debole. Questa valutazione tiene conto della diminuzione di sensibilità alla malattia con il progredire dello sviluppo degli acini, ma è particolarmente valida per i vigneti dove è stata attuata un'efficace lotta antioidica nella prima parte della stagione. Se non si è stati efficaci nel contrastare l'oidio svernante, soprattutto su vitigni sensibili, si ha sempre la possibilità di**

**infezioni tardive.** In questa fase della stagione, raccomandiamo quindi un attento monitoraggio dei vigneti per identificare precocemente eventuali attacchi.

Invitiamo a rinnovare la protezione fitosanitaria contro peronospora e oidio, utilizzando se necessario prodotti con efficacia su black rot.

Solo nei vigneti più precoci, senza presenza di peronospora e oidio sia su grappoli che su vegetazione, in caso di tempo stabile e secco, è possibile cominciare ad allungare gli intervalli tra i trattamenti prevedendo comunque di intervenire prima di eventuali precipitazioni.



Peronospora larvata su  
Merlot, Sementina  
27.06.2019.



Oidio su Chardonnay, Losone  
27.06.2019.

### **COLEOTTERO DEFOGLIATORE**

In alcuni vigneti del Cantone sono stati segnalati attacchi di un coleottero attualmente ancora in fase di determinazione. L'insetto è lungo circa 1.2 cm ed è di colore nero lucido. A seguito dell'attività trofica rimangono integre solo le nervature principali della foglia. Le defogliazioni possono essere importanti e possono ridurre significativamente le capacità fotosintetiche della pianta. Vi invitiamo a segnalare all'ufficio fitosanitario l'eventuale presenza dell'insetto.



Coleottero defogliatore su pianta di vite, Cantone  
01.07.2019