



INFORMAZIONI ORTICOLTURA n° 7 ANNO 18

LUGLIO 2015

A CURA DELL'UFFICIO DELLA CONSULENZA AGRICOLA
IL BOLLETTINO E' DISTRIBUITO A TUTTI GLI ABBONATI ALLA CONSULENZA
COSTO PER I NON ABBONATI CHF 30.- ANNUI
Consultabile anche su www.ti.ch/agricoltura

LAVORI IN AZIENDA

POMODORO

La difficoltà principale del mese di agosto risiede nel mantenere le piante in buono stato vegetativo, questo vale in modo particolare per i tunnel in plastica. Una pianta sana permetterà di far fronte sia alle richieste, che in agosto potranno essere ancora buone, sia alle esigenze qualitative che saranno ancora molto elevate.

Numerosi sono i fattori, sia di natura fitosanitaria sia tecnica, che possono influire negativamente sulle colture. Per quanto riguarda l'aspetto fitosanitario è primordiale mantenere un programma di trattamento stretto e severo, improntato sull'osservazione e su tempestivi interventi.

A livello tecnico durante il mese di agosto il potere di assorbimento delle piante è più ridotto

in quanto le giornate sono più corte e l'apparato radicale è sovente deteriorato da parassiti fungini o da nematodi. Questo implica la necessità di avere un substrato ben provvisto di elementi nutritivi in vicinanza delle radici. Per mantenere un buon livello qualitativo (frutti pieni e sodi), nelle colture che si vogliono conservare fino alla metà o alla fine settembre, eseguire una concimazione di copertura con 2 kg per ara di nitrato di potassio oppure 2 kg di solfato di potassio e 1 kg di nitrato ammonico. Questa concimazione di fondo potrà essere somministrata anche attraverso l'irrigazione con del nitrato di potassio solubile.

Le notti già più fresche di agosto agiscono negativamente sulla qualità dei frutti (cattiva

colorazione, screpolature). Per ovviare in parte all'inconveniente, chiudere i tunnel la sera, specialmente in previsione di precipitazioni notturne.

Per mantenere un buon livello qualitativo, al più tardi verso il 20 di agosto cimare le piante nei tunnel una foglia al di sopra dell'ultimo grappolo da conservare.

In particolar modo sul peretto, eseguire dove possibile irrigazioni di breve durata (bassinages) nei momenti più caldi della giornata. Questa operazione riduce il numero di frutti con necrosi apicale (culo nero) e colletto giallo-bruno (microfessure). Le colture di peretto soffrono spesso per la situazione climatica e pertanto questa operazione è di capitale importanza.

Non sfogliare eccessivamente le piante per limitare il rischio di microfessure e bruciature dovute all'esposizione diretta dei frutti. In agosto il potere vegetativo delle piante si riduce e il rischio di colpi di sole sul frutto aumenta di conseguenza.

Mantenere un regime d'irrigazione costante. Irrigare al mattino. Le irrigazioni pomeridiane o serali causano un assorbimento di acqua durante le ore notturne; ciò comporta un aumento della pressione nei tessuti che provoca la rottura

dell'epidermide con le conseguenti screpolature.

CICORIE, CAVOLFIORI, VERZE

Per ridurre il rischio di monta a fiore o di accecamento del cuore durante un periodo caldo, mantenere un suolo sufficientemente umido tramite irrigazioni regolari. Una buona umidità del suolo garantisce anche una migliore efficacia dei diserbanti eventualmente applicati in precedenza. Su cavolfiori e verze, in forte presenza di graminacee è possibile un'applicazione di un erbicida selettivo omologato contro queste malerbe monocotiledoni quale per esempio **Fusilade Max**.

Controllare attentamente le colture in merito alla presenza di agrotidi, mosca del cavolo e larve di lepidotteri. Contro le agrotidi intervenire alla sera con un **piretroide di sintesi** quale per esempio **Karate Zeon***, **Talstar SC***, **Decis***, **Decis Protech***, **Fury 10 EW*** oppure con **Pyrinex** o **Reldan 40** non appena si constatano i primi danni.

* I piretroidi di sintesi hanno una cattiva efficacia se applicati con temperature superiori a 25°C.

Nei diversi tipi di cavolo effettuare un trattamento contro la mosca con **dimetoato**

(per esempio **Perfekthion** o **Rogor 40**).

Proteggere le cicorie appena piantate tramite un'irrorazione di un prodotto contenente un **ditio-carbammato** quale per esempio **Ridomil Gold**, **Dithane Neotec**, **Mancozeb 80**.

Allo stadio giovanile le cicorie sono ancora poco sensibili all'oidio. Interventi contro questa malattia sono però da prevedere a partire da fine agosto.

Le insalate in genere possono inoltre essere facilmente preda di colonie di afidi. Controllare le colture e se necessario aggiungere un prodotto specifico contro l'insetto.

FINOCCHI

Dopo il trapianto, le giovani piante di finocchio con tempo caldo e secco vengono facilmente attaccate dai tripidi. Le punture nutrizionali di questi insetti succhiatori possono causare notevoli danni alle colture. Verificare con una lente la presenza del parassita e intervenire se necessario con un insetticida a largo spettro aggiungendo un bagnante.

LATTUGA CAPPuccio, LOLLO E CAVOLO RAPA

Le lattughe e i cavoli rapa destinati ai tunnel di 3 metri devono essere seminati entro il 10 agosto. Le ordinazioni delle piantine

sono quindi da fare entro inizio mese!

A dipendenza dell'ubicazione dell'azienda, per il grande tunnel e la serra, le lattughe devono essere seminate tra il 15 e il 30 agosto.

Per essere sicuri di ricevere le varietà richieste effettuare le ordinazioni per tempo debito!

Germinazione delle lattughe

Avendo la specie una temperatura di germinazione di 15°C le piantine sono particolarmente sensibili al caldo. La germinazione deve pertanto avvenire all'interno oppure in ambienti climatizzati a 15-18°C. Eventualmente ombreggiare con rete antigrandine e umidificare le semine in vivaio più volte al giorno fino alla schiusura delle pillole che di regola avviene da 2 a 3 giorni dopo semina.



VARIETÀ RACCOMANDATE

Lattuga cappuccio

FILINIA, ARCADIA, LETSGO
TEODORE

Lollo

MERCATO
LOZANO
CORENTINE

Foglia di quercia

KITONIA, PAGERO
ATTIRAI, ZOUMAI

Batavia

DONERTIE
NOVELSKI

Cavolo rapa

CINDY, EDER, LITTORIO

POMODORI E MELANZANE PROTEZIONE FITOSANITARIA

NEL MESE DI AGOSTO

Peronospora del pomodoro

Le condizioni climatiche di questa estate da record non sono favorevoli alla proliferazione della peronospora (*Phytophthora infestans*) ma è risaputo che agosto è caratterizzato da notti più lunghe e da precipitazioni temporalesche che alzano il grado di umidità dell'atmosfera e quindi dell'ambiente colturale.

Le colture devono perciò essere protette per evitare la proliferazione e il sopraggiungere della fitopatìa. A questo scopo sono a

disposizione due gruppi di prodotti:

- I cuproorganici composti da folpet + rame quali per esempio **Cuprosan U-DG**, **Vinipur**, **Folcupan**, **Perolan super**, eccetera.
- Gli organici come ad esempio **Forum**, **Verita**, **Ranman Top**, **Consento**, **Nativo**, **Revus Top** eccetera.

Ripetere gli interventi ogni 15 giorni con un'aggiunta di rame (attenzione: non miscelare **Verita** con del rame).

Termine di attesa per tutti questi prodotti: 3 giorni.

Oidio del pomodoro

In queste settimane l'oidio è in continua espansione. Agosto e settembre sono i mesi in cui questo fungo trova le condizioni ideali per il suo sviluppo e molto probabilmente assisteremo a una diffusione dello stesso in numerose colture (in modo particolare in quelle poco protette da fungicidi). È quindi veramente importante intraprendere ovunque adeguate misure di protezione.

Nessun fitofarmaco è garanzia di protezione totale e il controllo della malattia fungina nelle colture è molto difficile poiché nes-

sun prodotto manifesta una buona efficacia curativa. Una protezione continua e omogenea con prodotti specifici è pertanto indispensabile.

Per assicurare una buona efficacia è necessario alternare fungicidi con differenti sistemi di azione. Questo per poter rallentare l'insorgere di pericolose resistenze.

Nella tabella sottostante sono indicati i principali gruppi da alternare in un programma di trattamento. Da notare che **Nativo** contiene due sostanze appartenenti a due differenti gruppi e pertanto figura due volte nella lista.

ISS	Topas vino, Systhane viti, Slick, Sico, Bogard, Nativo, eccetera
Strobilurine	Amistar, Stroby, Nativo, eccetera
Inorganici	Zolfo bagnabile o in polvere, Armicarb da applicare in combinazione con Fenicur
SDHI	Moon Privilege

L'aggiunta di uno **zolfo bagnabile** quale per esempio **Thiovit Jet** allo 0.2% può migliorare l'efficacia dell'intervento. **Le applicazioni di zolfo sono inoltre d'aiuto nella lotta contro gli acari, frenando anche l'acariosi bronzea.**

Anche se all'inizio l'oidio è poco appariscente è importante non sottovalutarlo in quanto le colture possono venir completamente distrutte nello spazio di pochi giorni.

Cladosporiosi del pomodoro

Grazie alla resistenza genetica, la malattia è oggi problematica solo sulle varietà perette e cuore di bue. Il contenimento del fungo è particolarmente difficile a causa della scarsa efficacia dei pochi mezzi di lotta a disposizione.

L'unico prodotto efficace rimasto oggi in commercio è **Cercobin**. I lavori di selezione di varietà perette e cuore di bue resistenti sono in corso. Il cuore di bue resistente **Rugantino** è già in coltivazione con successo da qualche anno.

Nelle ultime settimane la malattia è in costante incremento!

Acari e acariosi bronzea del pomodoro

L'estate è ideale per la proliferazione degli acari e dell'acario-

si bronzea (*Aculops lycopersici*), parassiti che amano calore e bassa igrometria. Sul pomodoro le piante attaccate dagli acari sono facilmente riconoscibili per le chiazze bronzee sulle foglie e per i fusti rossicci. I prodotti omologati su pomodoro contro gli acari sono **Vertimec**, **Kiron**, **Arabella**, **Acramite** e da quest'anno **Kanemite** (Stähler). Solamente il primo possiede tuttavia un'omologazione contro l'acariosi bronzea che nel 2012 aveva causato ingenti danni sulle colture di tutta Europa. Lo scorso anno l'acariosi bronzea non ha preoccupato più di tanto mentre in questa stagione si sta attualmente diffondendo sulle colture. Per il momento la situazione sembra essere sotto controllo, eccezion fatta per qualche focolaio, ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime settimane.

Tignola del pomodoro

I risultati riguardanti le catture di *Tuta absoluta* nelle trappole disposte in tutto il cantone dall'Ufficio della consulenza agricola registrano attualmente solo pochi esemplari in una azienda del Sottoceneri. Tuttavia le catture sono state molto abbondanti già dall'inizio della primavera, tanto che in alcune

aziende si sono registrati attacchi sia su foglia che su frutto.

La situazione potrebbe quindi cambiare con l'arrivo di un periodo più temperato. Negli scorsi anni si erano già registrate delle impennate delle catture a fine agosto / settembre. L'evoluzione è costantemente monitorata e i dati delle catture vengono aggiornati regolarmente sul sito di Agroscope riguardante Orto Fito al seguente indirizzo:

<http://www.agroscope.admin.ch/gemuesebau/00916/00931/index.html?lang=it>

Sarà necessario controllare attentamente le proprie strutture, in quanto le infestazioni possono riguardare anche solamente una singola azienda come abbiamo potuto ben appurare quest'anno. Il potenziale di sviluppo è ormai presente in tutto il territorio cantonale destinato alla coltivazione del pomodoro.

Tripidi e TSWV su pomodoro

Come previsto sulle precedenti edizioni di questo bollettino, il caldo del mese di luglio ha favorito lo sviluppo dei tripidi, tra i quali il vettore principale del Tomato Spotted Wilt Virus **TSWV** del pomodoro, il tripide *Frankliniella occidentalis*. E così, puntualmente, la malattia si è presentata nelle aziende già colpite negli scorsi anni. Azien-

de ormai sparse sulla totalità del territorio cantonale.

Negli ultimi anni la selezione di varietà resistenti ha fatto passi enormi e ormai tutte le ditte sementiere propongono molteplici varietà resistenti. Grazie ad una richiesta del Ticino depositata al FFG negli scorsi anni, Agroscope sta esaminando 8 varietà resistenti in un'azienda del piano di Magadino. Sebbene il testimone sensibile sia stato colpito massicciamente dalla virosi, le varietà proposte sembrano resistere egregiamente alla virosi.



Davanti due piante testimoni attaccate dal virus. Dietro le varietà resistenti.

Tra le 8 varietà vi sono **Gloriette** e **Natyssa** già presenti da un paio di anni sulla nostra lista varietale. Nelle scorse settimane la Commissione tecnica ha organizzato, unitamente ad Agroscope, un paio di visite all'esperimento che ha destato particolare interesse al settore.



TSWV su frutto



Grappolo della varietà sensibile Abellus con caratteristici sintomi di TSWV

MELANZANE Acaro giallo

Nel mese di agosto il problema principale della melanzana è sicuramente causato dagli acari gialli che già si sono presentati, come visto sopra, in numerose aziende durante il mese di luglio. Come per il pomodoro, le piante devono essere regolarmente protette dagli attacchi del parassita. Una forte presenza di acari può causare addirittura la caduta delle foglie.

Prodotti omologati sulla melanzana sono **Vertimec**, **Arabella**, **Kiron**, **Acramite** e, come visto per il pomodoro **Kanemite**. Una buona lotta preventiva è rap-

presentata da frequenti irrigazioni di breve durata nei momenti più caldi della giornata, con lo scopo di creare un ambiente poco consono allo sviluppo del parassita.

Tripidi

Le punture nutrizionali del tripide conferiscono alla foglia una colorazione argentea e riducono il potere vegetativo delle piante. Per verificare la presenza del parassita esaminare l'interno dei fiori, ambiente fresco in cui l'insetto si rifugia durante il giorno. Contro i tripidi devono essere applicati prodotti insetticidi a breve termine di attesa come per esempio **Vertimec**, **Methomyl LG**, **Lannate 25 WP**, **Audienz**, **Karate Zeon**, **Talstar SC**, **Reldan 40**, **Pyrinex** eccetera.

È particolarmente importante alternare insetticidi con differente modo d'azione per evitare l'insorgere di resistenze e garantire una lotta ottimale. Tutte le soluzioni disponibili sono riportate sulle schede che trovate sul sito della consulenza agricola al seguente indirizzo:

<http://www4.ti.ch/dfe/de/sa/servizi/consulenza/orticoltura/schede-tecniche-per-lorticoltura/>



NUOVO PROGRAMMA PER LE NOTIFICHE DI PRODUZIONE SETTIMANALI E IL CENSIMENTO DELLE SUPERFICI A ORTAGGI

La Centrale Svizzera per l'Orticoltura si è dotata dal 2014 di un nuovo programma per l'annuncio settimanale elettronico della produzione orticola che costituisce la base di dati che l'UFAG utilizza per la gestione delle fasi doganali. Sotto impulso dei cantoni Berna e Friburgo, questo applicativo è stato ampliato così che si possano trasmettere i dati direttamente dalla produzione alla centrale senza passare da un'elaborazione cantonale intermedia. Il Canton Ticino, dopo una fase di test, ha deciso di aderire a questa iniziativa che mira a più vantaggi. L'obiettivo finale, oltre a quello di alleggerire e semplificare il rilevamento dei dati alla produzione, è quello di migliorare la qualità degli annunci, limitando il più possibile le fonti di errore involontari. Il programma dispone infatti di più controlli di plausibilità automatici che dovrebbero facilitare l'individuazione di errori quali per esempio errori di battitura, scambio inavvertito di articolo etc. Questa importante novità entrerà in funzione a partire dal mese di settembre.

La trasmissione dei dati verrà come sinora supervisionata dagli uffici cantonali che dovranno come sempre attestare l'esattezza e la completezza dei dati. Lo stesso strumento permette di rilevare inoltre le superfici coltivate e gli stock di legumi d'immagazzinaggio presenti presso i vari attori del mercato.