

Sezione dell'agricoltura
Servizio fitosanitario
telefono 091 814 35 86 / 85 / 87 / 57
servizio.fitosanitario@ti.ch

Malattie delle piante: conteniamo il problema

Il fuoco batterico

come comportarsi in una zona a bassa prevalenza

PIANTE OSPITI (in ordine di suscettibilità)

Piante da frutta

- 1. COTOGNO (Cydonia oblonga)
- 2. PERO (Pyrus communis)
- 3. MELO (Malus domestica)
- 4. NESPOLO (Mespillus germanica)

Piante spontanee

- 1. BIANCOSPINO (Crataegus spp.)
- 2. SORBO (Sorbus spp.)

Piante ornamentali

- 1. COTOGNASTRO (Cotoneaster spp.)
- 2. FOTINIA (Photinia davidiana)
- 3. AGAZZINO (Pyracantha coccinea)
- 4. PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)
- 5. COTOGNO DEL GIAPPONE (Chaenomeles spp.)
- 6. NESPOLO DEL GIAPPONE (Eriobotrya japonica)

SINTOMI



Solo parte della vegetazione è colpita e la foglia annerisce dalla base.



Ripiegamento ad uncino dei rametti e annerimento dei germogli e dei frutti.



Sintomo precoce: ripiegamento dei germogli ancora verdi.

Cosa fare?

Mantenere controllate le piante ospiti

Cercare eventuali sintomi del fuoco batterico: il periodo più sensibile è quello della fioritura, ma i sintomi possono apparire durante tutta la stagione vegetativa.

In caso di dubbio puoi rivolgerti al nostro Servizio

Servizio fitosanitario cantonale, i numeri da comporre sono 091 814 35 57/ 85/ 86/ 87 È possibile inviare delle fotografie a servizio fitosanitario@ti.ch

... in caso di sintomi confermati

• Eseguire le potature di risanamento

Potare ad almeno 40 cm dal limite visibile della parte infetta. Indossare una tuta e guanti monouso.

• Non compostare le parti malate

Eliminare il materiale di risulta con i rifiuti solidi urbani, incenerirlo sul posto o conferirlo al termovalorizzatore.

• Disinfettare gli attrezzi di potatura

In caso abbiate toccato una pianta sintomatica con le forbici, disinfettate gli attrezzi e risciacquate le mani con una soluzione antibatterica.

Si consiglia di lavare i vestiti utilizzati durante i tagli di risanamento a 60°C.

• Seguire il piano di trattamento consigliato

Per disinfettare le piante colpite è consigliato seguire il piano di trattamento accordato con il Servizio fitosanitario oppure indicato sull'indice per i prodotti fitosanitari in frutticoltura.