

Scheda misure pratiche | Insetti

Lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*) nei cantieri



CANTIERI

Il coleottero giapponese è un insetto che può provocare ingenti danni negli spazi verdi, nei boschi e nelle colture. Le larve di questo insetto si sviluppano nel terreno da settembre a giugno e si nutrono di radici. Per evitare la sua diffusione in territorio ticinese, lo spostamento dei primi 30 cm di suolo è regolamentato nella "Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman, Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni" dell'UFAG.



1.

RICONOSCERE

Larva

La larva di *Popillia japonica* si presenta sempre ripiegata, assumendo una forma a C.

Il colore è arancione sulla testa, biancastro nella parte centrale e marroncino nella parte terminale. Ha tre paia di zampe e le dimensioni della larva variano dai 2 mm ai 30 mm circa.


È importante sapere che è molto simile a quella del maggiolino o di altri coleotteri e l'identificazione è possibile solo con l'aiuto di un binocolare.



2.

Adulto

- 1 Due ciuffi pelosi bianchi più grandi nella parte posteriore.
- 2 Cinque ciuffi pelosi bianchi su ogni lato.
- 3 Lunghezza ca. 8-12 mm.



3.



CANTIERI

MISURE OBBLIGATORIE

1. Vietato trasportare

È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo escavati dai cantieri:

- **al di fuori della zona infestata;**
- **dalla zona cuscinetto alla zona indenne.**



Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle deroghe da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (autorizzazione al trasporto dopo analisi del suolo, valevole solo per la zona infestata) oppure all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (trasporto in discarica e interrimento a 2 m di profondità).


2. Pulire veicoli e attrezzi

I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:

- **lasciano la zona infestata;**
- **si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.**



Zona indenne



Zona cuscinetto

Zona infestata

4.

Cartina di delimitazione delle zone con i dettagli dei comuni interessati sul sito www.ti.ch/coleottero-giapponese



COSA FARE?

In caso di ritrovamento di larve sospette contattare il Servizio fitosanitario e conservare in un barattolo chiuso alcune larve per permettere l'identificazione.

È necessario che tutte le persone coinvolte nei cantieri prestino la massima attenzione!

IMMAGINI

3 - Repubblica e Cantone Ticino
1, 2, 4 - Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario

Informazioni

Sul sito www.ti.ch/coleottero-giapponese sono pubblicate le misure vigenti alla lotta al coleottero giapponese ed è possibile scaricare il volantino in formato PDF.

