






Prescrizioni per campi, prati e pascoli

QUANDO RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE SPECIALE?












Domanda di autorizzazione per l'applicazione di prodotti per il trattamento delle piante secondo le esigenze PER "Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari" secondo l'art. 18 e l'allegato I cifra 6.2 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).


















Legenda:





-  Consentito, rispettando le istruzioni ufficiali per l'uso dei prodotti fitosanitari (PF) e tenendo in considerazione le soglie d'intervento.
-  Autorizzazione speciale necessaria, emessa dal Servizio fitosanitario cantonale.
-  Non autorizzato.





















Divieto di trattamento invernale



Tra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di PF (sono compresi i molluschicidi) non sono autorizzate.

ERBICIDA	ERBICIDI NON SELETTIVI IN CAMPICOLTURA	Treatmento delle stoppie a fine estate, poi semina di una coltura con o senza aratura.	
		Aratura in autunno e erbicida non selettivo dopo il 15 febbraio, poi semina di una coltura estiva senza aratura.	
		Treatmento di una coltura intercalare dopo il 15 febbraio, poi semina di una coltura estiva con o senza aratura.	
		Treatmento delle stoppie dopo il 15 febbraio, poi semina di una coltura estiva con o senza aratura.	
		Treatmento con erbicida non selettivo prima della risemina di una coltura.	
		Treatmento di un maggese di rotazione o un maggese fiorito alla fine del periodo di messa in coltura, poi semina di una coltura con o senza aratura.	
		Treatmento di una coltura intercalare (sovescio) prima del 1° novembre, poi semina di una coltura autunnale con o senza aratura.	
		Treatmento di una coltura intercalare (sovescio) prima del 1° novembre, poi semina di una coltura estiva con o senza aratura.	
	ERBICIDI NON SELETTIVI SU PRATI PERMANENTI/TEMPORANEI	Treatmento di prati permanenti o temporanei, poi semina di una coltura con o senza aratura.	
		Treatmento di prati permanenti o temporanei, poi aratura prima della semina di una coltura.	
Risanamento totale dei prati permanenti o artificiali, poi risemina con o senza aratura.			

ERBICIDA	CEREALI	Trattamento in pre-emergenza (tutti i tipi di cereali) fino al 10 ottobre.	
		Trattamento in pre-emergenza (tutti i tipi di cereali) dopo il 10 ottobre.	
		Trattamento in post-emergenza (tutti i tipi di cereali) tra il 1° novembre e il 15 febbraio.	
	COLZA	Trattamento in pre-semina o post-emergenza.	
		Trattamento erbicida tra il 1° novembre e il 15 febbraio.	
	MAIS	Trattamento localizzato (p.es. a strisce) in pre-emergenza.	
		Trattamento in post-emergenza o localizzato (non appena le piante di mais sono visibili).	
		Trattamento in pre-emergenza per mais su prato.	
		Trattamento in pre-semina con Dual Gold contro lo zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>).	
		Trattamento di superficie in pre-emergenza (ad eccezione del mais da seme).	
		Trattamento in pre-emergenza o post-emergenza (di superficie o localizzato).	
	PATATE	Disseccamento chimico della parte aerea.	
		Trattamento erbicida primaverile prima del 15 febbraio.	
		Trattamento pianta per pianta.	
	SUPERFICI FORAGGERE	Prati temporanei: trattamento di superficie con prodotto selettivo dopo la semina e prima del primo utilizzo (il taglio di pulizia non conta come primo utilizzo).	
		Prati permanenti: trattamento di superficie con prodotto selettivo nell'ambito di un risanamento se la superficie foraggera interessata <20%.	
Prati permanenti: trattamento di superficie con prodotto selettivo nell'ambito di un risanamento se la superficie foraggera interessata >20%.			

FUNGICIDA	IN GENERALE	Autorizzato in osservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione e riportate in etichetta (eccezioni in frutticoltura e viticoltura).	
		Trattamento fungicida autunnale dopo il 1° novembre.	
		Trattamento fungicida primaverile prima del 15 febbraio.	
		Concia delle sementi con prodotti fungicidi.	

INSETTICIDA	IN GENERALE	Concia delle sementi con prodotti insetticidi.	
		Trattamento insetticida autunnale dopo il 1° novembre.	
		Trattamento insetticida primaverile prima del 15 febbraio.	
	CEREALI	Criocera dei cereali: prodotti a base di Spinosad, a partire dalla soglia di 2 larve per fusto.	
		Criocera dei cereali: altri prodotti (p. es. Biscaya, Gazelle 120 FL,...), a partire della soglia di 2 larve per fusto.	
		Afidi: fino a fine spigatura, se almeno il 60% delle spighe sono colpite.	
		Altri prodotti e parassiti.	
	MAIS	Concia delle sementi con prodotti insetticidi.	
		Piralide del mais: utilizzo del tricogramma.	
		Granulati applicati al momento della semina.	
		Altri prodotti e parassiti.	
	PATATE	Dorifora: preparati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> , prodotti a base di Spinosad o prodotti a base di olio di Neem.	
		Dorifora: altri prodotti (piretroidi, neonicotinoidi).	
		Afidi: trattamento di patate da consumo o per l'industria con prodotti a base di Flonicamide, Pymetrozine o Spritotetramati (p. es. Teppeki, Plenum WG o Movento SC).	
		Afidi: trattamento di patate da consumo o per l'industria con altri prodotti.	
		Granulati utilizzati alla piantagione contro nematodi, elateridi o altri parassiti. (attenzione! I prodotti contenenti Clorpirifos sono stati ritirati dal mercato o possono essere utilizzati solo fino ad una determinata data, controllare la validità dei prodotti su www.psm.admin.ch)	
		Altri prodotti o parassiti.	
	GIRASOLI	Afidi: trattamenti rispettosi degli insetti ausiliari (p. es. Pirimicarb 50 WG), se più del 50% delle foglie sono deformi (a partire dello stadio BBCH 51).	
	MOLLUSCHICIDA	Prodotti contenenti metaldeide o fosfati di ferro II.	
		Utilizzo di prodotti anti-limacce tra il 1° novembre e il 15 febbraio.	

FITO- REGOLATORI	Tutti i prodotti utilizzati conformemente all'autorizzazione/etichetta.	
	Produzione Estenso.	

TESTIMONE	5x5 m	<p>I) In caso di trattamento erbicida in pre-emergenza su cereali</p> <p>II) In caso d'autorizzazione speciale per i trattamenti erbicidi autunnali dal 1° novembre.</p> <p>III) In caso d'autorizzazione speciale per i trattamenti primaverili prima del 15 febbraio.</p> <p>IV) In caso d'autorizzazione speciale per l'utilizzo di insetticidi non granulati (salvo siano presenti insetti nocivi ad uno stadio molto mobile).</p> <p>Il testimone non trattato è comunque consigliato in tutti gli altri casi, affinché si possa controllare l'efficacia del trattamento.</p>
------------------	--------------	--