

Epidemiologia del carcinoma dell'esofago in Ticino

Alcuni dati aggiornati
2008

Andrea Bordoni
Alessandra Spitale
Registro tumori cantone Ticino
Istituto cantonale di patologia
Locarno
www.ti.ch/tumori




Note introduttive

- Carcinomi dell'esofago sono relativamente poco frequenti nella donna, per contro nell'uomo si osserva una maggiore incidenza
- L'incidenza è in diminuzione nell'uomo, costante nella donna ⁽¹⁾
- La sopravvivenza relativa a 5 anni in Europa è del 10-15%, in Ticino 12.4%
- L'istotipo piu' frequente è quello squamocellulare
- Il fattore di rischio maggiore è l'abuso simultaneo di alcool e tabacco
- La diagnosi è spesso posta ad uno stadio avanzato


(1) Stewart B, Kleihues P. World Cancer Report, WHO, IARCPress, Lyon 2003




Incidenza nel mondo, tumori dell'esofago. Uomini



Incidenza nel mondo, tumori dell'esofago. Donne



Incidenza in Europa, tumori dell'esofago. Uomini e donne



La frequenza in Ticino

Numero di tumori maligni invasivi diagnosticati
tra i residenti del Canton Ticino, 1996-2007


	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	96-07
uomini													
Esofago	20	23	14	17	31	14	11	15	9	22	24	12	213
Tutti i tumori*	792	711	828	758	802	804	909	891	852	960	980	936	10223
donne													
Esofago	3	4	5	6	9	3	4	9	5	4	7	3	62
Tutti i tumori*	719	710	708	764	754	745	795	784	885	867	888	822	9441

*Tutti i tumori, esclusi C44 (cute)


Registro Tumori Canton Ticino, 1996-2007, uomini e donne, frequenza.




Distribuzione dei tumori dell'esofago in funzione del sesso. Ticino, 1996-2007



Distribuzione dei tumori dell'esofago in funzione dell'età. Ticino, 1996-2007



Distribuzione dei tumori dell'esofago in funzione dello stadio T clinico alla diagnosi. Ticino, 1996-2007



Distribuzione dei tumori dell'esofago in funzione dello stadio M clinico alla diagnosi. Ticino, 1996-2007

