



Repubblica e
Cantone Ticino



il farmacista e le droghe

G. M. Zanini, Pharmactuel Ticino,
Manno, 29 settembre 2003



la mamma di Pierino

- ◆ è cliente fissa della vostra farmacia da anni
- ◆ ha fiducia in voi
- ◆ però mantiene le distanze, resta piuttosto riservata

» “una cliente normale”



Pierino

- ◆ lo avete visto nascere ma **adesso che va alle medie** non lo vedete più
 - ◆ conoscete la sua storia sanitaria (niente di particolare)
 - ◆ non sapete come vive e come se la cava a scuola
- » “un ragazzo normale”



Pierino e il lupo

secondo le statistiche, con quali sostanze
Pierino può già essere in contatto ?

e se del caso, come consuma ?

 cosa sappiamo \pm già ?



Repubblica e
Cantone Ticino




Trends im Konsum psychoaktiver Substanzen von Schülerinnen und Schülern in der Schweiz

Ausgewählte Ergebnisse einer Studie,
durchgeführt unter der
Schirmherrschaft der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)

ISPA
rapporto 39
aprile 2003



Abbildung 3 Relativer Anteil der Schülerinnen und Schüler, die schon einmal geraucht haben und in wie weit dies durch Zigaretten geschah, nach Altersgruppen (2002)



	Schüler			Schülerinnen			
	11-12	13-14	15-16	Alter	11-12	13-14	15-16
Schon einmal Tabak geraucht	23.6%	43.2%	61.4%		14.4%	39.7%	63.1%
□ keine Zigarette	3.1%	2.5%	3.1%		1.2%	1.6%	1.9%
▨ 1-4 Zigaretten	13.5%	19.7%	20.4%		9.7%	19.8%	20.8%
■ >4 Zigaretten	7.0%	21.0%	37.9%		3.5%	18.3%	40.4%



Abbildung 4 Mindestens wöchentliches Rauchen nach Geschlecht, Altersgruppen und Untersuchungsjahr







Abbildung 5 Mindestens tägliches Rauchen nach Geschlecht, Altersgruppen und Untersuchungsjahr





	M	F
	N=220	N=202

-
- | | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| • kein Abhängigkeitsanzeichen | 16.8% | 14.4% |
| • 1 Abhängigkeitsanzeichen | 25.9% | 26.7% |
| • 2 Abhängigkeitsanzeichen | 43.2% | 34.7% |
| • 3 Abhängigkeitsanzeichen | 14.1% | 24.3% |
-



Abbildung 8 Mindestens wöchentlicher Alkoholkonsum nach Altersgruppen, Geschlecht und Untersuchungsjahr







Abbildung 13 Mindestens zweimalige Trunkenheit nach Geschlecht, Altersgruppen und Untersuchungsjahr





Repubblica e
Cantone Ticino



droghe negli adolescenti:

preoccupazione nr. 1:

ALCOL

preoccupazione nr. 2:

TABACCO




alcol: pro memoria

- ◆ 1 porzione standard da ristorante:
 - ~ 10-12 g alcol
 - ~ 0.2 promille
 - ~ 2 ore per eliminare
- ◆ 1 dl vino / 3 dl birra / 0.4 dl aperitivi -
digestivi / 0.2 - 0.4 dl distillati




Abbildung 14 Lebenszeitprävalenz, einmaliger und mehrmaliger Konsum von Cannabis bei 15-/16-Jährigen nach Geschlecht und Untersuchungsjahr



Lebenszeitprävalenz	12.3%	14.6%	27.0%	40.6%	49.9%	10.6%	4.9%	21.4%	29.5%	39.1%
mehrmals	8.5%	10.9%	20.1%	29.4%	39.6%	7.2%	4.1%	14.4%	23.1%	32.2%
einmal	3.8%	3.7%	6.9%	11.2%	10.3%	3.4%	0.8%	7.0%	6.4%	6.9%



Abbildung 15 12-Monatsprävalenz, einmaliger und mehrmaliger Konsum von Cannabis in den letzten 12 Monaten bei 15-/16-Jährigen nach Geschlecht und Untersuchungsjahr



12-Monatsprävalenz	38.5%	41.7%	27.9%	34.1%
■ mehrmals	28.4%	34.9%	22.1%	28.6%
▨ einmal	10.1%	6.8%	5.8%	5.5%



Abbildung 16 Häufigkeit des Cannabiskonsums in den letzten 12 Monaten bei 15-/16-Jährigen nach Geschlecht (2002)








Abbildung 18 *Bereitschaft zum Konsum, Zugang, Normative Überzeugung und Gefahrenwahrnehmung des Cannabis bei 15-/16-Jährigen nach Geschlecht und Konsumstatus (2002)*





Ma fumano proprio tutti ?

inchiesta 2002 Uni ZH / UFSP
giovani 14 - 20 anni (N= 2344)





Repubblica e
Cantone Ticino



Droga	M	F
Solventi	5.6	6.4
Funghi allucinogeni	5.5	3.8
Medicamenti	2.0	4.2
Ecstasy	2.7	3.8
Stimolanti	2.8	2.9
LSD	2.4	2.0
Cocaina	3.4	1.7
Eroina, Oppio, Morfina e simili	1.7	0.6
Baltok	0.8	0.2
Altri	9.9	7.3



Abbildung 19 Anteil der 15-/16-jährigen Schülerinnen und Schüler, die zur Annahme verschiedener psychoaktiver Substanzen bereit sind (2002)

