

GLI EFFETTI COLLATERALI SONO RARI

REAZIONE IMMUNITARIA E SINTOMI DI BREVE DURATA

I sintomi osservabili dopo la vaccinazione sono l'espressione della reazione immunitaria e sono quindi del tutto normali. Si tratta di sintomi di breve durata come rossore, dolore e gonfiore al braccio, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari o articolari e febbre. In pochi casi (meno di 1 su cento) a distanza di una settimana circa dalla vaccinazione è anche possibile la comparsa di gonfiore e arrossamento sul braccio vaccinato, una reazione sgradevole ma innocua che scompare spontaneamente e senza conseguenze. In casi molto rari e soprattutto tra gli uomini giovani, alcuni giorni dopo la vaccinazione, sono stati osservati dolori al petto, affanno e palpitazione, dovuti a un'infiammazione del muscolo cardiaco e del pericardio, con decorso perlopiù favorevole. Reazioni allergiche gravi, che necessitano di cure tempestive, sono molto rare e di solito compaiono dopo pochi minuti dalla somministrazione del vaccino. Per questo motivo si raccomanda di rimanere in osservazione 15 minuti dopo la vaccinazione.

MILIONI DI PERSONE VACCINATE E UN MONITORAGGIO GLOBALE

Effetti indesiderati severi causati dalla vaccinazione sono rari. Questi dati sono stati confermati dall'esperienza delle campagne di vaccinazione in corso nel mondo. In Svizzera oltre 4.25 milioni di persone (stato: 11 agosto 2021) si sono vaccinate e nella quasi totalità dei casi non hanno manifestato alcun disturbo. Il monitoraggio in questo campo è in pieno svolgimento e proseguirà anche in futuro.

Le informazioni di questa scheda riguardano unicamente i vaccini a mRNA.

QUALCHE MESE PER EFFETTI INDESIDERATI

Per quanto riguarda gli effetti indesiderati a lungo termine, gli osservazioni sono limitate dato che il coronavirus è comparso di recente. Tuttavia, da studi su altri vaccini sappiamo che gli effetti tardivi, cioè che potrebbero causare un problema di salute, sono rari e si manifestano di regola entro sei settimane dalla somministrazione. I vaccini contro il coronavirus vengono somministrati in Svizzera da ormai 8 mesi e hanno rivelato finora effetti indesiderati gravi solo in rari casi.

I PROBLEMI DEL "LONG COVID"

Se da un lato gli effetti indesiderati severi causati dalla vaccinazione sono rari, dall'altro sappiamo che un'infezione da COVID-19 ha ben più probabilità di essere pericolosa e comportare problemi di salute a lungo termine. Grazie al monitoraggio dei casi di coronavirus oggi sappiamo che i sintomi più frequenti della sindrome post COVID-19 (la cosiddetta "long COVID") sono stanchezza, tosse persistente e continui mal di testa.



EFFETTI INDESIDERATI?

La Dr. med. Anita Niederer-Loher spiega quali effetti indesiderati possono manifestarsi e perché è un buon segno.

IL VACCINO È SICURO

Reazioni allergiche gravi: 1 ogni 100'000 persone vaccinate

MAGGIORI INFORMAZIONI

www.ti.ch/vaccinazione
www.ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione

www.swissmedic.ch
www.infovac.ch