

DEFINIZIONE DI CASO (criteri clinici + criteri epidemiologici)

Chikungunya

Dengue

Criteri clinici	
<p>Dengue classica</p> <ul style="list-style-type: none">- febbre superiore ai 38.5°C che perdura da 3-5 giorni- forte mal di testa, dolori retro-orbitali, intensi dolori osteo-articolari e muscolari, disturbi gastrointestinali- possibile eruzione cutanea estesa che non interessa mani e piedi dalla durata di 1-5 giorni <p style="text-align: center;">Q</p> <p>Dengue emorragica</p> <ul style="list-style-type: none">- febbre superiore ai 38.5°C che perdura da 3-5 giorni- evidenza di manifestazioni emorragiche con abbassamento dei trombociti e stato di shock.	<ul style="list-style-type: none">- esordio acuto di febbre superiore ai 38.5°C- poliartralgie intense e importanti (tale da limitare le normali attività quotidiane)
E	
Criteri epidemiologici	
<p>A) Viaggi: soggiorno nei 15 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi in Paesi in cui la malattia è endemica (zone tropicali e subtropicali di Africa, Sud-est asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America latina (per es. Brasile) e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico).</p> <p>B) Trasmmissione locale: in presenza di focolai autoctoni, messa in evidenza di una correlazione epidemiologica tra il caso indice e 2 o più casi autoctoni.</p>	<p>A) Viaggi: soggiorno nei 15 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi in Paesi in cui la malattia è endemica (Africa subsahariana, nel Sud-Est asiatico, nel subcontinente indiano e nelle isole dell'Oceano Indiano).</p> <p>B) Trasmmissione locale: in presenza di focolai autoctoni, messa in evidenza di una correlazione epidemiologica tra il caso indice e 2 o più casi autoctoni.</p>