

IL QUESTIONARIO RAP (RAPID ADDICTION PROFILE)

Presentazione

La popolazione alcool- e tossico- dipendente è molto eterogenea. Presenta una grande diversità di problemi medico-psico-sociali con gradi d'intensità variabile, rendendo la valutazione difficile nei pazienti più o meno motivati ed a stadi diversi di crisi.

Esistono più strumenti di misura della dipendenza. Inoltre, si tratta di strumenti di ricerca che necessitano una formazione adeguata talvolta lunga.

Per questo motivo abbiamo sviluppato questo profilo multidimensionale della dipendenza, destinato a facilitare la valutazione fatta degli operatori in prima linea, in particolar modo dai medici curanti. Questo profilo tende a fare brevemente la sintesi dei diversi approcci (somatico, psichiatrico, motivazionale, di crisi, e delle risorse) utili ad un trattamento in rete multidisciplinare. Il profilo permette anche di definire le priorità nella presa a carico.

Come rispondere ?

Le domande di cui sopra vertono sulla valutazione della gravità dei problemi del vostro paziente in 5 dimensioni. Per rispondere a queste domande, bisogna utilizzare i punteggi che permettono di codificare ogni dimensione in 4 gradi di gravità. Le descrizioni cliniche sono date come esempio, scegliete il grado di gravità che si avvicina di più al vostro paziente. 1= nessun problema, 2= qualche problema, 3= seri problemi, 4= problemi maggiori.

Esempi

Dimensione somatica:

Un tossicomane con una sierologia positiva per l'epatite C sarà codificato "3" solo in caso di epatite sintomatica; in caso contrario sarà codificato "2".

Dimensione psichiatrica:

La maggior parte dei pazienti dipendenti presenta un disturbo della personalità; codificare "2" se questo disturbo è presente; codificare "3" se una sintomatologia manifesta si aggiunge (disturbo ansioso, disturbo depressivo); codificare "4" se la stessa situazione si complica con il rischio di suicidio.

Rapid Addiction Profile

