



Nutria

Myocastor coypus

Descrizione e ciclo biologico

Roditore erbivoro generalista molto prolifico considerato semi-acquatico, originario del Sud America. L'adulto non ha predatori naturali. Si trova in laghi, fiumi, canali e paludi, ma anche in aree urbane a bassa altitudine. Attivo di notte, ma spesso visibile anche di giorno, in particolare durante i periodi più freddi.

È molto simile a un ratto di grandi dimensioni o a un castoro, ma a differenza di quest'ultimo ha la coda da topo non appiattita e senza pelliccia; lungo circa 50 cm, con la coda raggiunge i 90 cm. Ha dei grandi incisivi arancioni-gialli.

Diffusione

Presente sulle rive del lago Maggiore e nei canali circostanti.

Problema

Causa danni alla biodiversità: mangia enormi quantità di piante acquatiche, tuberi e radici e può avere un impatto negativo sugli uccelli nidificanti in acqua perché utilizza i nidi galleggianti come piattaforme per il riposo, con il rischio di affondarli o di rompere le uova deposte al loro interno. Può inoltre causare danni economici: nel caso di densi popolamenti può arrecare danni agli argini di canali e fiumi, a manufatti idraulici e alle colture.

Misure di lotta

- Intrappolare l'animale e avvisare l'Ufficio della caccia e della pesca (www.ti.ch/ucp - tel. 091 814 28 71).



Foto: Federico Tettamanti

Regolamentazione

Lista delle specie esotiche invasive (UFAM, 2022); OEDA (Art. 15 e 52); OCP (Art. 8).

Scheda tecnica di info fauna al seguente link:
<https://species.infofauna.ch/groupe/21/portrait/2214>

Ulteriori informazioni e contatti:

Dipartimento del territorio
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
Via Franco Zorzi 13 - 6501 Bellinzona

Tel. 091 814 29 71
dt-spaas.neobiota@ti.ch
www.ti.ch/neobiota

